

化学療法指示書

登録番号 108

CDDP + S-1 5週毎 3～6コース

ID:				
氏名			指示者	
身長	cm	体重	kg	体表面積 m ²

・非小細胞肺癌

CDDP (cisplatin、シスプラチン) 80mg/m² = ()mg/body Day8
 S-1 (エスワン) ()mg/回を1日2回 朝・夕 Day1～21
 体表面積 1.25m²未満 40mg/回 (80mg/day)
 1.25m²～1.5m²未満 50mg/回 (100mg/day)
 1.5m²以上 60mg/回 (120mg/day)
 *S-1 3週投与、2週休薬の5週毎投与

※内服薬
 Day8: アプレピタント(125mg) 1cap ルート確保時に
 Day9、10: アプレピタント(80mg) 1cap 朝食後
 Day9～11: デカドロン4mg 2錠 朝食後

コース目 月 日 (day 8)

生理食塩液100ml ルート確保・フラッシュ用

パロノセトロン注(0.75mg) 1袋
 デキサート(6.6mg) 1A
 デキサート(1.65mg) 2A

15分

ルートキープ時に
 アプレピタント(125mg) 1cap内服

KN3号500mL
 硫酸マグネシウム補正液 8mL

90分

KN3号500mL

90分

マンニトールS300mL

30分

フロセミド(20mg) 1A
 (マンニトールS終了後、i.v.)

生理食塩液 500mL
 シスプラチン ()mg
 (全量500mLとする)

120分

生理食塩液 500mL

90分

KN3号500mL

90分

◆ 嘔気時:(開始後28日目)まで 適宜下記を投与

1) グラニセトロン注(3mg/50mL) 1袋 + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(30分)

(1日に2回まで)

2) 生食100 mL + デキサート(6.6mg) 1A + エリーテン(10 mg) 1A 点滴静注(60分)

(1日に1回まで)

<治療開始基準>

治療開始基準	第2コース以降day1開始基準	第2コース以降の投与量減量基準			
PS:0-1	PS:0-1		TS-1		CDDP
WBC \geq 4000	WBC \geq 3000	WBC<1000	80mg/日 → 50mg/日 → 40mg/日 100mg/日 → 80mg/日 → 50mg/日 120mg/日 → 100mg/日 → 80mg/日		減量なし
NEU \geq 1500	NEU \geq 1500	PLT<25000			
Hb \geq 9.0	PLT \geq 10000	発熱性好中球減少			
PLT \geq 100000	AST/ALT \leq 100/100	T-Bil \geq 2.0			
AST/ALT \leq 100/100	T-Bil \leq 1.5	非血液毒性 \geq G3			
T-Bil \leq 1.5	Cre \leq 1.2	血清Cre \geq 2.0			60→50
Cre \leq 1.2	肺臓炎/肺浸潤 \leq G1				
クレアチニンクリアランス \geq 60	その他の自他覚所見および 一般臨床所見(低Na血症は除く) \leq G2				
感染を伴う38℃以上の発熱がない	感染を伴う39℃以上の発熱がない				

TS-1 休薬・再開基準		
項目	休薬基準	再開基準
WBC	2000未満	2000以上
NEU	1000未満	1000以上
PLT	50000未満	75000以上
T-Bil	2.0以上	1.5以下
Cre	1.5以上	1.2以下
下痢・口内炎	G2 以上	G1 以下
感染	感染を疑う発熱 (\geq 38℃)	感染を疑う発熱なし
非血液毒性 (低Na血症は除く)	G3 以上	G2 以下