

患者名 様
 ID
 治療日 .

化学療法名 ABVD

指示医師: _____

化学療法指示	day1	点滴	day15	点滴																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="4">Regimen</th></tr> <tr><td>Doxorubicin</td><td>25 mg/m²</td><td>day 1, 15</td><td></td></tr> <tr><td>Bleomycin</td><td>10 mg/m²</td><td>day 1, 15</td><td></td></tr> <tr><td>Vinblastine</td><td>6 mg/m²</td><td>day 1, 15</td><td></td></tr> <tr><td>Dacarbazine</td><td>375 mg/m²</td><td>day 1, 15</td><td></td></tr> </table> <p>① 薬剤投与量決定</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>年齢</td><td> 才</td></tr> <tr><td>身長</td><td> cm</td></tr> <tr><td>実体重</td><td> kg</td></tr> <tr><td>標準体重*</td><td>0.0 kg</td></tr> <tr><td>体表面積</td><td>0.00 m²</td></tr> <tr><td>体表面積*</td><td>0.00 m²</td></tr> <tr><td>採用体表面積</td><td>0.00 m²</td></tr> <tr><td>全体/年齢係数</td><td> </td></tr> <tr><td>肺係数(BLM)</td><td> (80歳以上は原則=0)</td></tr> <tr><td>心係数(Dox)</td><td> </td></tr> <tr><td>肝係数(Dox/VBL)</td><td> </td></tr> <tr><td>腎係数(BLM/DTIC)</td><td> </td></tr> <tr><td>神経係数(VBL)</td><td> </td></tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr><th colspan="2">算出値</th><th colspan="2">処方量</th></tr> <tr><td>ドキソルビシン</td><td>0</td><td> mg</td><td></td></tr> <tr><td>プレオ</td><td>0.0</td><td> mg</td><td>(max. 15mg)</td></tr> <tr><td>エクザール</td><td>0.0</td><td> mg</td><td></td></tr> <tr><td>ダカルバジン</td><td>0</td><td> mg</td><td></td></tr> </table>	Regimen				Doxorubicin	25 mg/m ²	day 1, 15		Bleomycin	10 mg/m ²	day 1, 15		Vinblastine	6 mg/m ²	day 1, 15		Dacarbazine	375 mg/m ²	day 1, 15		年齢	 才	身長	 cm	実体重	 kg	標準体重*	0.0 kg	体表面積	0.00 m ²	体表面積*	0.00 m ²	採用体表面積	0.00 m ²	全体/年齢係数	 	肺係数(BLM)	 (80歳以上は原則=0)	心係数(Dox)	 	肝係数(Dox/VBL)	 	腎係数(BLM/DTIC)	 	神経係数(VBL)	 	算出値		処方量		ドキソルビシン	0	 mg		プレオ	0.0	 mg	(max. 15mg)	エクザール	0.0	 mg		ダカルバジン	0	 mg		<p>体調の確認</p> <p>体温 °C SpO2 %</p> <p>血圧 脈拍 </p> <p>倦怠感 有・無</p> <p>労作時息切れ 有・無</p> <p>鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無</p> <p>咳・喀痰 有・無</p> <p>発疹 有・無</p> <p>食欲不振 有・無</p> <p>腹痛・嘔気 有・無</p> <p>下痢 有・無</p> <p>便秘 有・無</p> <p>その他体調不良 有・無</p> <p>看護師署名 _____</p> <p>治療実施 可 不可</p> <p>医師署名 _____</p>	<p>点滴</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>生食</td><td>100 ml</td></tr> <tr><td colspan="2">ルート確保・フラッシュ用</td></tr> </table> <p>① ← パロノセトン注 1袋</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>デキサート</td><td>9.9mg</td></tr> <tr><td colspan="2">側管、全開</td></tr> </table> <p>② ← エクザール 0 mg</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>生食</td><td>50 ml</td></tr> <tr><td colspan="2">側管、全開</td></tr> </table> <p>③ ← ダカルバジン 0 mg</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>生食</td><td>250 ml</td></tr> <tr><td colspan="2">側管、点滴、1時間</td></tr> <tr><td colspan="2">ボトル遮光</td></tr> </table> <p>④ ← ドキソルビシン 0 mg</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>生食</td><td>50 ml</td></tr> <tr><td colspan="2">側管、点滴、30分</td></tr> </table> <p>⑥ ← プレオ 0 mg</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>生食</td><td>100 ml</td></tr> <tr><td colspan="2">側管、点滴、1時間</td></tr> </table> <p>内服 day1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>アプレピタントカプセル125mg</td><td>1 cap</td></tr> <tr><td colspan="2">点滴開始時</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ロキソプロフェン錠60mg</td><td>2 錠</td></tr> <tr><td colspan="2">分2、 昼・夕</td></tr> </table> <p>day2,3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>アプレピタントカプセル80mg</td><td>1 cap</td></tr> <tr><td colspan="2">分1 朝食後</td></tr> </table> <p>day2,3,4</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>デカドロン錠4mg</td><td>2 錠</td></tr> <tr><td colspan="2">分2 朝昼食後</td></tr> </table>	生食	100 ml	ルート確保・フラッシュ用		デキサート	9.9mg	側管、全開		生食	50 ml	側管、全開		生食	250 ml	側管、点滴、1時間		ボトル遮光		生食	50 ml	側管、点滴、30分		生食	100 ml	側管、点滴、1時間		アプレピタントカプセル125mg	1 cap	点滴開始時		ロキソプロフェン錠60mg	2 錠	分2、 昼・夕		アプレピタントカプセル80mg	1 cap	分1 朝食後		デカドロン錠4mg	2 錠	分2 朝昼食後		<p>体調の確認</p> <p>体温 °C SpO2 %</p> <p>血圧 脈拍 </p> <p>倦怠感 有・無</p> <p>労作時息切れ 有・無</p> <p>鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無</p> <p>咳・喀痰 有・無</p> <p>発疹 有・無</p> <p>食欲不振 有・無</p> <p>腹痛・嘔気 有・無</p> <p>下痢 有・無</p> <p>便秘 有・無</p> <p>その他体調不良 有・無</p> <p>看護師署名 _____</p> <p>治療実施 可 不可</p> <p>医師署名 _____</p>	<p>点滴</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>生食</td><td>100 ml</td></tr> <tr><td colspan="2">ルート確保・フラッシュ用</td></tr> </table> <p>① ← パロノセトン注 1袋</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>デキサート</td><td>9.9mg</td></tr> <tr><td colspan="2">側管、全開</td></tr> </table> <p>② ← エクザール 0 mg</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>生食</td><td>50 ml</td></tr> <tr><td colspan="2">側管、全開</td></tr> </table> <p>③ ← ダカルバジン 0 mg</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>生食</td><td>250 ml</td></tr> <tr><td colspan="2">側管、点滴、1時間</td></tr> <tr><td colspan="2">ボトル遮光</td></tr> </table> <p>④ ← ドキソルビシン 0 mg</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>生食</td><td>50 ml</td></tr> <tr><td colspan="2">側管、点滴、30分</td></tr> </table> <p>⑥ ← プレオ 0 mg</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>生食</td><td>100 ml</td></tr> <tr><td colspan="2">側管、点滴、1時間</td></tr> </table> <p>内服 day15</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>アプレピタントカプセル125mg</td><td>1 cap</td></tr> <tr><td colspan="2">点滴開始時</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ロキソプロフェン錠60mg</td><td>2 錠</td></tr> <tr><td colspan="2">分2、 昼・夕</td></tr> </table> <p>day16,17</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>アプレピタントカプセル80mg</td><td>1 cap</td></tr> <tr><td colspan="2">分1 朝食後</td></tr> </table> <p>day16,17,18</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>デカドロン錠4mg</td><td>2 錠</td></tr> <tr><td colspan="2">分2 朝昼食後</td></tr> </table>	生食	100 ml	ルート確保・フラッシュ用		デキサート	9.9mg	側管、全開		生食	50 ml	側管、全開		生食	250 ml	側管、点滴、1時間		ボトル遮光		生食	50 ml	側管、点滴、30分		生食	100 ml	側管、点滴、1時間		アプレピタントカプセル125mg	1 cap	点滴開始時		ロキソプロフェン錠60mg	2 錠	分2、 昼・夕		アプレピタントカプセル80mg	1 cap	分1 朝食後		デカドロン錠4mg	2 錠	分2 朝昼食後	
Regimen																																																																																																																																																										
Doxorubicin	25 mg/m ²	day 1, 15																																																																																																																																																								
Bleomycin	10 mg/m ²	day 1, 15																																																																																																																																																								
Vinblastine	6 mg/m ²	day 1, 15																																																																																																																																																								
Dacarbazine	375 mg/m ²	day 1, 15																																																																																																																																																								
年齢	 才																																																																																																																																																									
身長	 cm																																																																																																																																																									
実体重	 kg																																																																																																																																																									
標準体重*	0.0 kg																																																																																																																																																									
体表面積	0.00 m ²																																																																																																																																																									
体表面積*	0.00 m ²																																																																																																																																																									
採用体表面積	0.00 m ²																																																																																																																																																									
全体/年齢係数	 																																																																																																																																																									
肺係数(BLM)	 (80歳以上は原則=0)																																																																																																																																																									
心係数(Dox)	 																																																																																																																																																									
肝係数(Dox/VBL)	 																																																																																																																																																									
腎係数(BLM/DTIC)	 																																																																																																																																																									
神経係数(VBL)	 																																																																																																																																																									
算出値		処方量																																																																																																																																																								
ドキソルビシン	0	 mg																																																																																																																																																								
プレオ	0.0	 mg	(max. 15mg)																																																																																																																																																							
エクザール	0.0	 mg																																																																																																																																																								
ダカルバジン	0	 mg																																																																																																																																																								
生食	100 ml																																																																																																																																																									
ルート確保・フラッシュ用																																																																																																																																																										
デキサート	9.9mg																																																																																																																																																									
側管、全開																																																																																																																																																										
生食	50 ml																																																																																																																																																									
側管、全開																																																																																																																																																										
生食	250 ml																																																																																																																																																									
側管、点滴、1時間																																																																																																																																																										
ボトル遮光																																																																																																																																																										
生食	50 ml																																																																																																																																																									
側管、点滴、30分																																																																																																																																																										
生食	100 ml																																																																																																																																																									
側管、点滴、1時間																																																																																																																																																										
アプレピタントカプセル125mg	1 cap																																																																																																																																																									
点滴開始時																																																																																																																																																										
ロキソプロフェン錠60mg	2 錠																																																																																																																																																									
分2、 昼・夕																																																																																																																																																										
アプレピタントカプセル80mg	1 cap																																																																																																																																																									
分1 朝食後																																																																																																																																																										
デカドロン錠4mg	2 錠																																																																																																																																																									
分2 朝昼食後																																																																																																																																																										
生食	100 ml																																																																																																																																																									
ルート確保・フラッシュ用																																																																																																																																																										
デキサート	9.9mg																																																																																																																																																									
側管、全開																																																																																																																																																										
生食	50 ml																																																																																																																																																									
側管、全開																																																																																																																																																										
生食	250 ml																																																																																																																																																									
側管、点滴、1時間																																																																																																																																																										
ボトル遮光																																																																																																																																																										
生食	50 ml																																																																																																																																																									
側管、点滴、30分																																																																																																																																																										
生食	100 ml																																																																																																																																																									
側管、点滴、1時間																																																																																																																																																										
アプレピタントカプセル125mg	1 cap																																																																																																																																																									
点滴開始時																																																																																																																																																										
ロキソプロフェン錠60mg	2 錠																																																																																																																																																									
分2、 昼・夕																																																																																																																																																										
アプレピタントカプセル80mg	1 cap																																																																																																																																																									
分1 朝食後																																																																																																																																																										
デカドロン錠4mg	2 錠																																																																																																																																																									
分2 朝昼食後																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="5">ChemoNavi</th></tr> <tr><th colspan="5">投与サイクル数</th></tr> <tr><td colspan="5" style="text-align: center;">6-8サイクル</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">↓</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">.....</td><td style="text-align: center;">15</td><td style="text-align: center;">.....</td></tr> <tr><td>治療日</td><td></td><td></td><td></td><td>28</td></tr> <tr><td>ドキソルビシン</td><td style="text-align: center;">●</td><td></td><td style="text-align: center;">●</td><td></td></tr> <tr><td>プレオ</td><td style="text-align: center;">●</td><td></td><td style="text-align: center;">●</td><td></td></tr> <tr><td>エクザール</td><td style="text-align: center;">●</td><td></td><td style="text-align: center;">●</td><td></td></tr> <tr><td>ダカルバジン</td><td style="text-align: center;">●</td><td></td><td style="text-align: center;">●</td><td></td></tr> </table>					ChemoNavi					投与サイクル数					6-8サイクル					↓	1	15	治療日				28	ドキソルビシン	●		●		プレオ	●		●		エクザール	●		●		ダカルバジン	●		●																																																																																																										
ChemoNavi																																																																																																																																																										
投与サイクル数																																																																																																																																																										
6-8サイクル																																																																																																																																																										
↓	1	15																																																																																																																																																						
治療日				28																																																																																																																																																						
ドキソルビシン	●		●																																																																																																																																																							
プレオ	●		●																																																																																																																																																							
エクザール	●		●																																																																																																																																																							
ダカルバジン	●		●																																																																																																																																																							