

患者名 _____ 様 ID _____

化学療法 MPV
第 コース

指示医師: _____

実施日

化学療法指示	day1	day2	day3	day4	day5								
<table border="1"> <tr> <th>Regimen</th> <th>MVP</th> </tr> <tr> <td>MTX 3500 mg/m²/2 h</td> <td>day 1</td> </tr> <tr> <td>VCR 1.4 mg/m²</td> <td>day 1</td> </tr> <tr> <td>Procarbazine 100 mg/m², p.o.</td> <td>day 1-7</td> </tr> </table> <p>① 薬剤投与量決定</p> <p>年齢 <input type="text"/> 才</p> <p>身長 <input type="text"/> cm</p> <p>実体重 <input type="text"/> kg</p> <p>標準体重* 0.0 kg</p> <p>体表面積 0.00 m²</p> <p>体表面積* 0.00 m²</p> <p>採用体表面積 0.00 m²</p> <p>年齢係数 (MTX) <input type="text"/></p> <p>年齢係数 <input type="text"/></p> <p>前治療係数 <input type="text"/></p> <p>算出値 処方量</p> <p>メトトレキサート注射液 (200mg/A) → <input type="text"/> mg = <input type="text"/> A</p> <p>オンコピン 0.0 mg <input type="text"/> mg</p> <p>プロカルバジン 0.0 錠 <input type="text"/> 錠</p> <p>② 内服</p> <p>塩酸プロカルバジン 0 錠 × 7日 分2 or 3、(奇数サイクル)</p> <p>ダイアモクス(250) 2 錠 × 4日 分2</p> <p>指示医師: _____</p>	Regimen	MVP	MTX 3500 mg/m ² /2 h	day 1	VCR 1.4 mg/m ²	day 1	Procarbazine 100 mg/m ² , p.o.	day 1-7	<p>体温 _____ °C</p> <p>SpO₂ _____ %</p> <p>血压 _____</p> <p>脈拍 _____</p> <p>・倦怠感 有・無</p> <p>・労作時息切れ 有・無</p> <p>・鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無</p> <p>・咳・喀痰 有・無</p> <p>・発疹 有・無</p> <p>・食欲不振 有・無</p> <p>・腹痛・嘔気 有・無</p> <p>・下痢 有・無</p> <p>・便秘 有・無</p> <p>・その他体調不良 有・無</p> <p>看護師署名 _____</p> <p>治療実施 可 不可</p> <p>医師署名 _____</p>	<p>点滴</p> <p>KN3 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>① 02:00 - 06:00</p> <p>② 06:00 - 09:30</p> <p>生理食塩液 100ml</p> <p>ルート確保・フラッシュ用</p> <p>デキサト(6.6) 1 V</p> <p>生食 100 ml</p> <p>09:30 - 10:00</p> <p>グラニセト[®]注(3mg/50mL)1袋</p> <p>10:00 全開</p> <p>オンコピン _____ mg</p> <p>生食 50 ml</p> <p>10:00 全開</p> <p>メトトレキサート(200mg/A) _____ A</p> <p>5%TZ 400 ml</p> <p>10:00 - 12:00</p> <p>生食 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>③ 12:00 - 16:00</p> <p>KN3B 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>④ 16:00 - 20:00</p> <p>⑤ 20:00 - 00:00</p> <p>KN3 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>① 22:00 - 02:00</p>	<p>KN3 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>① 00:00 - 04:00</p> <p>② 04:00 - 08:00</p> <p>③ 08:00 - 12:00</p> <p>④ 12:00 - 16:00</p> <p>⑤ 16:00 - 20:00</p> <p>⑥ 20:00 - 00:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ① 10:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ② 16:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ③ 22:00</p>	<p>KN3 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>① 00:00 - 06:00</p> <p>② 06:00 - 12:00</p> <p>③ 12:00 - 18:00</p> <p>④ 18:00 - 00:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ① 04:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ② 10:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ③ 16:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ④ 22:00</p>	<p>KN3 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>① 00:00 - 06:00</p> <p>② 06:00 - 12:00</p> <p>③ 12:00 - 18:00</p> <p>④ 18:00 - 00:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ① 04:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ② 10:00</p>
Regimen	MVP												
MTX 3500 mg/m ² /2 h	day 1												
VCR 1.4 mg/m ²	day 1												
Procarbazine 100 mg/m ² , p.o.	day 1-7												
	<p>内服</p>	<p>ダイアモクス 2 錠</p> <p>分 2</p> <p>塩酸プロカルバジン 0 錠</p> <p>分2 or 3</p>	<p>ダイアモクス 2 錠</p> <p>分 2</p> <p>塩酸プロカルバジン 0 錠</p> <p>分2 or 3</p>	<p>ダイアモクス 2 錠</p> <p>分 2</p> <p>塩酸プロカルバジン 0 錠</p> <p>分2 or 3</p>	<p>ダイアモクス 2 錠</p> <p>分 2</p> <p>塩酸プロカルバジン 0 錠</p> <p>分2 or 3</p> <p style="text-align: right;">止</p>								
	<p>検査</p> <p>MTX血中濃度危険限界</p> <p>24時間値 1 × 10⁻⁵M 尿PHが7.0未満なら ⇒</p> <p>48時間値 1 × 10⁻⁶M メイロン(20) 1A 側管 iv</p> <p>72時間値 1 × 10⁻⁷M</p>	<p>尿PH</p> <p>06:00 _____ 18:00 _____</p> <p>12:00 _____ 22:00 _____</p>	<p>10:00 MTX血中濃度</p> <p>尿PH</p> <p>06:00 _____ 18:00 _____</p> <p>12:00 _____ 22:00 _____</p>		<p>まで</p>								

患者名 様
ID

化学療法名 **R-MPV**

指示医師:

開始日

第 コース

化学療法指示	治療日	day 1																																																																																																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Regimen Rituximab 375 mg/m² day 0 MTX 3500 mg/m²/2 h day 1 VCR 1.4 mg/m² day 1 Procarbazine 100 mg/m², p.o. day 1-7 Procarbazineは奇数サイクルのみ </div> <p>① 薬剤投与量決定</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>年齢</td><td><input type="text"/></td><td>才</td></tr> <tr><td>身長</td><td><input type="text"/></td><td>cm</td></tr> <tr><td>実体重</td><td><input type="text"/></td><td>kg</td></tr> <tr><td>標準体重*</td><td>0.0</td><td>kg</td></tr> <tr><td>体表面積</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>体表面積*</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>採用体表面積</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>心係数</td><td><input type="text"/></td><td></td></tr> <tr><td>前治療係数</td><td><input type="text"/></td><td></td></tr> </table> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><th style="text-align: left;">算出値</th><th style="text-align: left;">処方量</th></tr> <tr><td>リツキサン</td><td>0 <input type="text"/> mg</td></tr> <tr><td>生食</td><td>0 <input type="text"/> ml</td></tr> </table> <p>② 内服薬処方</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><td>ロキソプロフェン</td><td>1 錠</td></tr> <tr><td>レスタミンコーワ</td><td>3 錠</td></tr> </table>	年齢	<input type="text"/>	才	身長	<input type="text"/>	cm	実体重	<input type="text"/>	kg	標準体重*	0.0	kg	体表面積	0.00	m ²	体表面積*	0.00	m ²	採用体表面積	0.00	m ²	心係数	<input type="text"/>		前治療係数	<input type="text"/>		算出値	処方量	リツキサン	0 <input type="text"/> mg	生食	0 <input type="text"/> ml	ロキソプロフェン	1 錠	レスタミンコーワ	3 錠	<p>体調確認</p> <p>・ 体温 <input type="text"/> °C SpO2 <input type="text"/> %</p> <p>・ 血圧 <input type="text"/> 脈拍 <input type="text"/></p> <p>・ 倦怠感 有・無</p> <p>・ 労作時息切れ 有・無</p> <p>・ 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無</p> <p>・ 咳・喀痰 有・無</p> <p>・ 発疹 有・無</p> <p>・ 食欲不振 有・無</p> <p>・ 腹痛・嘔気 有・無</p> <p>・ 下痢 有・無</p> <p>・ 便秘 有・無</p> <p>・ その他体調不良 有・無</p> <p>看護師署名 <input type="text"/></p> <p>治療実施 可 不可</p> <p>医師署名 <input type="text"/></p>	<p>① ロキソプロフェン 1 錠 レスタミンコーワ 3 錠 内服</p> <p>② ソルコーテフ 100 mg 生食 100 ml 点滴、30分</p> <p style="text-align: right;">医師署名 <input type="text"/></p> <p>↓</p> <p>③ リツキサン <input type="text"/> mg 生食 0 ml 滴下速度の設定</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><td>A設定</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>B設定</td><td><input type="text"/></td></tr> </table> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><th style="width:50%;">A設定</th><th style="width:50%;">B設定</th></tr> <tr><td>25ml/h (1時間)</td><td>100ml/h (1時間)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">↓</td><td style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr><td>100ml/h (1時間)</td><td>200ml/h</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">↓</td><td style="text-align: center;">↓</td></tr> <tr><td>200ml/h</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">↓</td><td></td></tr> </table> <p>リツキサン点滴経過</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:10%;">脈拍</th> <th style="width:10%;">血圧</th> <th style="width:10%;">SpO2</th> <th style="width:10%;">体温</th> <th style="width:10%;">痒み</th> <th style="width:10%;">発疹</th> <th style="width:10%;">嘔気</th> <th style="width:10%;">胸苦</th> <th style="width:10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>前</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td style="text-align: right;">:</td></tr> <tr><td>30分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td style="text-align: right;">:</td></tr> <tr><td>60分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td style="text-align: right;">:</td></tr> <tr><td>120分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td style="text-align: right;">:</td></tr> <tr><td>終了時</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td style="text-align: right;">:</td></tr> </tbody> </table> <p>・ 血管痛 有・無</p> <p>・ 点滴漏れ 有・無</p> <p>・ その他の問題 有・無</p> <p style="text-align: right;">実施看護師署名: <input type="text"/></p>	A設定	<input type="text"/>	B設定	<input type="text"/>	A設定	B設定	25ml/h (1時間)	100ml/h (1時間)	↓	↓	100ml/h (1時間)	200ml/h	↓	↓	200ml/h		↓			脈拍	血圧	SpO2	体温	痒み	発疹	嘔気	胸苦		前					有・無	有・無	有・無	有・無	:	30分					有・無	有・無	有・無	有・無	:	60分					有・無	有・無	有・無	有・無	:	120分					有・無	有・無	有・無	有・無	:	終了時					有・無	有・無	有・無	有・無	:
年齢	<input type="text"/>	才																																																																																																																			
身長	<input type="text"/>	cm																																																																																																																			
実体重	<input type="text"/>	kg																																																																																																																			
標準体重*	0.0	kg																																																																																																																			
体表面積	0.00	m ²																																																																																																																			
体表面積*	0.00	m ²																																																																																																																			
採用体表面積	0.00	m ²																																																																																																																			
心係数	<input type="text"/>																																																																																																																				
前治療係数	<input type="text"/>																																																																																																																				
算出値	処方量																																																																																																																				
リツキサン	0 <input type="text"/> mg																																																																																																																				
生食	0 <input type="text"/> ml																																																																																																																				
ロキソプロフェン	1 錠																																																																																																																				
レスタミンコーワ	3 錠																																																																																																																				
A設定	<input type="text"/>																																																																																																																				
B設定	<input type="text"/>																																																																																																																				
A設定	B設定																																																																																																																				
25ml/h (1時間)	100ml/h (1時間)																																																																																																																				
↓	↓																																																																																																																				
100ml/h (1時間)	200ml/h																																																																																																																				
↓	↓																																																																																																																				
200ml/h																																																																																																																					
↓																																																																																																																					
	脈拍	血圧	SpO2	体温	痒み	発疹	嘔気	胸苦																																																																																																													
前					有・無	有・無	有・無	有・無	:																																																																																																												
30分					有・無	有・無	有・無	有・無	:																																																																																																												
60分					有・無	有・無	有・無	有・無	:																																																																																																												
120分					有・無	有・無	有・無	有・無	:																																																																																																												
終了時					有・無	有・無	有・無	有・無	:																																																																																																												

患者名 _____ 様 ID _____

化学療法 R-MPV
第 コース

指示医師: _____

実施日 _____

化学療法指示	day1	day2	day3	day4	day5
<p>Regimen MVP</p> <p>MTX 3500 mg/m²/2 h day 1</p> <p>VCR 1.4 mg/m² day 1</p> <p>Procarbazine 100 mg/m², p.o. day 1-7</p> <p>① 薬剤投与量決定</p> <p>年齢 <input type="text"/> 才</p> <p>身長 <input type="text"/> cm</p> <p>実体重 <input type="text"/> kg</p> <p>標準体重* 0.0 kg</p> <p>体表面積 0.00 m²</p> <p>体表面積* 0.00 m²</p> <p>採用体表面積 0.00 m²</p> <p>年齢係数(MTX) <input type="text"/></p> <p>年齢係数 <input type="text"/></p> <p>前治療係数 <input type="text"/></p> <p>算出値 処方量</p> <p>メトレキサート注射液 (200mg/A) → <input type="text"/> mg = <input type="text"/> A</p> <p>オンコピン 0.0 mg <input type="text"/> mg</p> <p>プロカルバジン 0.0 錠 <input type="text"/> 錠</p> <p>② 内服</p> <p>塩酸プロカルバジン 0 錠 x 7日 分2 or 3、(奇数サイクル)</p> <p>ダイアモックス(250) 2 錠 x 4日 分2</p> <p>指示医師: _____</p>	<p>体調の確認</p> <p>体温 _____ °C</p> <p>SpO₂ _____ %</p> <p>血圧 _____</p> <p>脈拍 _____</p> <p>・倦怠感 有・無</p> <p>・労作時息切れ 有・無</p> <p>・鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無</p> <p>・咳・喀痰 有・無</p> <p>・発疹 有・無</p> <p>・食欲不振 有・無</p> <p>・腹痛・嘔気 有・無</p> <p>・下痢 有・無</p> <p>・便秘 有・無</p> <p>・その他体調不良 有・無</p> <p>看護師署名 _____</p> <p>治療実施 可 不可</p> <p>医師署名 _____</p>	<p>点滴</p> <p>KN3 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>① 02:00 - 06:00</p> <p>② 06:00 - 09:30</p> <p>生理食塩液 100ml</p> <p>ルート確保・フラッシュ用</p> <p>デキサート(6.6) 1 V</p> <p>生食 100 ml</p> <p>09:30 - 10:00</p> <p>グラネセロン注(3mg/50mL)1袋</p> <p>10:00 全開</p> <p>オンコピン _____ mg</p> <p>生食 50 ml</p> <p>10:00 全開</p> <p>メトレキサート(200mg/A) _____ A</p> <p>5%TZ 400 ml</p> <p>10:00 - 12:00</p> <p>生食 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>③ 12:00 - 16:00</p> <p>KN3B 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>④ 16:00 - 20:00</p> <p>⑤ 20:00 - 00:00</p> <p>内服</p> <p>ダイアモックス 2 錠 分2</p> <p>塩酸プロカルバジン 0 錠 分2 or 3</p>	<p>KN3 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>① 00:00 - 04:00</p> <p>② 04:00 - 08:00</p> <p>③ 08:00 - 12:00</p> <p>④ 12:00 - 16:00</p> <p>⑤ 16:00 - 20:00</p> <p>⑥ 20:00 - 00:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ① 10:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ② 16:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ③ 22:00</p> <p>ダイアモックス 2 錠 分2</p> <p>塩酸プロカルバジン 0 錠 分2 or 3</p> <p>10:00 MTX血中濃度</p> <p>尿PH</p> <p>06:00 _____ 18:00 _____</p> <p>12:00 _____ 22:00 _____</p>	<p>KN3 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>① 00:00 - 06:00</p> <p>② 06:00 - 12:00</p> <p>③ 12:00 - 18:00</p> <p>④ 18:00 - 00:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ① 04:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ② 10:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ③ 16:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ④ 22:00</p> <p>ダイアモックス 2 錠 分2</p> <p>塩酸プロカルバジン 0 錠 分2 or 3</p>	<p>KN3 500 ml</p> <p>メイロン 40 ml</p> <p>① 00:00 - 06:00</p> <p>② 06:00 - 12:00</p> <p>③ 12:00 - 18:00</p> <p>④ 18:00 - 00:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ① 04:00</p> <p>レボホリナート 10.5mg</p> <p>5%ブドウ糖液 8.4mL</p> <p>側 ② 10:00</p> <p>ダイアモックス 2 錠 分2</p> <p>塩酸プロカルバジン 0 錠 分2 or 3</p> <p>尿PH</p> <p>06:00 _____ 18:00 _____</p> <p>12:00 _____ 22:00 _____</p> <p>まで</p>
<p>MTX血中濃度危険限界</p> <p>24時間値 1 x 10⁻⁵M 尿PHが7.0未満なら ⇒</p> <p>48時間値 1 x 10⁻⁶M メイロン(20) 1A 側管 iv</p> <p>72時間値 1 x 10⁻⁷M</p>					

