化学療法名 DA-EPOCH

患者名 ________ ID

治療日 ~ ~ _____

12.7 m/2 2 = 1 = 1

指示医師:

ChemoNavi	治療内容	day 1	day 2	day 3	day 4
Chomonavi	体調の確認	内服確認	au L	udy 0	ady i
RegimenEtoposide 50 mg/m^2 day 1- 4Vincristine 0.4 mg/m^2 day 1- 4Doxorubicine 10 mg/m^2 day 1- 4	体温 <u>°C</u>	プレドニン 0 錠 分2、朝・昼 持続点滴	プレドニン 0 錠 分2、朝・昼	プレドニン 0 錠 分2、朝・昼	プレドニン 0 錠 分2、朝・昼
Cyclophosphamide	SpO2 % 血圧 // (a) 脈拍 // (a) 機力 // (a) 大時息切れ // (a) 身汁・鼻閉・咽頭痛 // (a) 水管 // (a) 食欲不振 // (a) 腹痛 // (a) 下痢 // (a)	生理食塩液100ml ルート確保用 エトポシド 0 mg トキソルビシン 0 mg オンコビン 0 mg 生食 500 ml 10:00 - 22:00 ← クラニセトロン注 (3mg/50mL)1袋 側管、全開、10:00	↓ エトポシド 0 mg ドキソルビシン 0 mg オンコビン 0 mg 生食 500 ml 10:00 - 22:00	↓ エトポシド 0 mg トキソルビシン 0 mg オンコビン 0 mg 生食 500 ml 10:00 - 22:00	
DAR (「利 便秘 有・無 その他体調不良 有・無 看護師署名 一 治療実施 可・不可 医師署名	エトポシド 0 mg ト*キソルビ・シン 0 mg オンコビン 0 mg 生食 500 ml 22:00 - 翌10:00 ← ク*ラーセトロン注 (3mg/50mL)1袋 側管、全開、22:00	ドキソルビシン 0 mg オンコビン 0 mg 生食 500 ml 22:00 - 翌10:00 ← グラニセトロン注 (3mg/50mL)1袋 側管、全開、22:00	ドキソルビシン 0 mg オンコビン 0 mg 生食 500 ml 22:00 -翌10:00 ← ケラニセトロン注 (3mg/50mL)1袋 側管、全開、22:00	ドキソルビシン 0 mg オンコビン 0 mg 生食 500 ml 22:00 − 翌10:00 ← ケラニセトロン注 (3mg/50mL)1袋 側管、全開、22:00
内服 プレドニン	ト・キソルビシン溶解法 ト・キソルビ・シン 10mg を生食20ml で溶解し、うち 0.0 mlを使用 オンコビン溶解法(1ボトル分) オンコビン 1mg を生食 20ml で溶解し、うち 0.0 mlを使用	day 5 内服確認 プレドニン 0 錠 分2、朝・昼 点滴 エンドキサン 0 mg 生食 100 ml 10:00 − 10:30 ← がラニセトロン注 (3mg/50mL)1袋 側管、全開、10:00	1月0日 ↓		21