患者名 _____ 様　　化学療法名 IDA+AC

ID

指示医師: _____

治療開始日 _____

化学療法指示

Regimen

Cytarabine	100 mg/m²/24h	day 1-7
Idarubicin	12 mg/m²	day 1-3

① 薬剤投与量決定

年齢		才
身長		cm
実体重		kg
標準体重*	0.0	kg
体表面積	0.00	m²
体表面積*	0.00	m²
採用体表面積	0.00	m²
年齢係数		
心係数		

	算出値	処方量	
キロサイド	0		mg /12時間
イダマイシン	0.0		mg

ｲﾀﾞﾏｲｼは蒸留水で溶解

キロサイド溶解液	生食
キロサイド①	10:00-22:00
キロサイド②	22:00-10:00
イダマイシン	10:00-10:30

第1治療日

vital sign

体温 ____ ℃　　SpO2 ____ %

血圧 ____　　脈拍 ____

治療実施　可・不可

医師署名 _____

第1治療日

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
10:00-22:00

← ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 (3mg/50mL) 1袋
10:00 全開

← ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ 0 mg
生食 100 ml
10:00-10:30

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
22:00-10:00

第2治療日

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
10:00-22:00

← ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 (3mg/50mL) 1袋
10:00 全開

← ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ 0 mg
生食 100 ml
10:00-10:30

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
22:00-10:00

第3治療日

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
10:00-22:00

← ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 (3mg/50mL) 1袋
10:00 全開

← ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ 0 mg
生食 100 ml
10:00-10:30

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
22:00-10:00

第4治療日

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
10:00-22:00

← ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 (3mg/50mL) 1袋
10:00 全開

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
22:00-10:00

第5治療日

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
10:00-22:00

← ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 (3mg/50mL) 1袋
10:00 全開

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
22:00-10:00

第6治療日

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
10:00-22:00

← ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 (3mg/50mL) 1袋
10:00 全開

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
22:00-10:00

第7治療日

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
10:00-22:00

← ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注 (3mg/50mL) 1袋
10:00 全開

キロサイド 0 mg
生食 500 ml
22:00-10:00

ChemoNavi

1月0日 ↓

	1	2	3	4	5	6	7	8
キロサイド								
イダマイシン	●	●	●					