

# 化学療法指示書

## Erlotinib + Bmab



療法

<適応疾患>

・非小細胞肺がん  
(腺がん)

患者ID					
患者氏名				指示医師	
身長	cm	体重	kg	体表面積	

### 投与スケジュール



### 投与開始基準

第1コースday1開始基準	タルセバ休薬基準	第2コース以降day1開始基準
PS0-2	AST/ALT ≥ 100	PS0-2
WBC ≥ 3000	T-BIL ≥ 1.5mg/dL	感染を伴う38℃以上の発熱がない
PLT ≥ 100000	PS ≥ 3	WBC ≥ 3000またはNEU ≥ 1500
AST/ALT ≤ 100	間質性肺炎 ≥ grade1	PLT ≥ 75000
T-BIL ≤ 1.5mg/dL	発疹 ≥ grade3	AST/ALT ≤ 100
クレアチニン ≤ 1.2mg/dL	その他非血液毒性(※を除く) ≥ grade2	クレアチニン ≤ 施設正常値上限
		コントロール不良の高血圧がない

### タルセバ減量基準

項目	減量1回目	減量2回目
発疹 ≥ grade3(主治医判断でgrade2でも)	100mg	50mg
下痢 ≥ grade2		
ASTまたはALT ≥ 200		
血液毒性 ≥ grade3		
非血液毒性 ≥ grade3		
その他(主治医判断)		