

化学療法指示書

エリブリン 療法

患者ID				アルコール過敏症:	
患者氏名				指示医師	
身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²

適応疾患

* 手術不能または
再発乳がん

投与スケジュール

Day (投与日) 1 (/) 8 (/) 15 22 (/)

Eribulin
(1.4 mg/m²)



3週ごと 投薬 (2週投薬 1週休薬)

生理食塩液100ml ルート確保・フラッシュ用

[:]

本体①
生理食塩液 100mL
デキサート(6.6mg) 1V



[:]

本体②
生理食塩液 50mL
ハラヴェン mg
(1.4 mg/m²)



ハラヴェン 各サイクル1週目
前サイクルにおいて下記の副作用が発現した場合、減量した上で投与
●7日間を超えて持続する好中球数減少(<500/mm ³)
●発熱または感染症を伴う好中球減少(<1000/mm ³)
●血小板減少(<25000/mm ³)
●輸血を要する血小板減少(<25000/mm ³)
●Grade3異常の非血液毒性
●副作用等により、2週目に休薬した場合

[:]

本体③
生理食塩液 100mL



ハラヴェン減量の目安	
減量前の投与量	減量後の投与量
1.4mg/m ²	→ 1.1mg/m ²
1.1mg/m ²	→ 0.7mg/m ²
0.7mg/m ²	→ 投与中止を考慮