

化学療法指示書

エリブリン+ Tmab


療法

患者ID				アルコール過敏症:	
患者氏名				指示医師	
身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²

適応疾患

* HER2陽性の手術不能又は再発乳がん

投与スケジュール



3週ごと 投薬 (2週投薬 1週休薬)

生理食塩液100ml ルート確保用

[:]

本体①	
生理食塩液	100mL
デキサート(6.6mg)	1V

15分

[:]

本体②	
生理食塩液	250mL
トラスツズマブBS	mg
(6 mg/kg)	

90分

(初回のみ:8mg/kg
生理食塩液250mL 1V
トラスツズマブBS _____ mg)

※トラスツズマブBS

初回投与の忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる

[:]

本体③	
生理食塩液	50mL
ハラヴェン	mg
(1.4 mg/m ²)	

5分

ハラヴェン 各サイクル1週目

前サイクルにおいて下記の副作用が発現した場合、減量した上で投与

- 7日間を超えて持続する好中球数減少(<500/mm³)
- 発熱または感染症を伴う好中球減少(<1000/mm³)
- 血小板減少(<25000/mm³)
- 輸血を要する血小板減少(<25000/mm³)
- Grade3異常の非血液毒性
- 副作用等により、2週目に休薬した場合

[:]

本体④	
生理食塩液	100mL

全開

ハラヴェン減量の目安

減量前の投与量	→	減量後の投与量
1.4mg/m ²	→	1.1mg/m ²
1.1mg/m ²	→	0.7mg/m ²
0.7mg/m ²	→	投与中止を考慮