

治療日:

化学療法指示書


5FU+CDDP (FP) 療法

適応疾患

- * 転移性再発食道がん^{注1}
- * stage II、III 食道がん術前^{注2}

患者ID					指示医師				
患者氏名				身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²

投与スケジュール




注1: 4週ごとと繰り返し
注2: 3週毎 2サイクル

Day1:

生理食塩液100ml ルート確保用

本体①	[:]
生理食塩液	500mL
フルオロウラシル	0 mg
(400mg/m ²)	

本体②	[:]
生理食塩液	500mL
フルオロウラシル	0 mg
(400mg/m ²)	



側①	[:]
ソリタT3	500mL

側②	[:]
ソリタT3	500mL

側③	[:]
生理食塩液	100mL
ホスアプレピタント	150mg 1V

側④	[:]
パロノセトロン注	1袋
デキサート (6.6mg)	1V
デキサート (1.65mg)	2A

側⑤	[:]
生理食塩液	500mL
シスプラチン	mg
(80mg/m ²)	

側⑥	[:]
ソルアセトF	500mL

側⑦	[:]
ソルアセトF	500mL

側⑧	[:]
マンニトールS	300mL

Day2:

本体①	[:]
生理食塩液	500mL
フルオロウラシル	0 mg
(400mg/m ²)	

12時間

30分

側①	[:]
生理食塩液	100mL
デキサート(6.6mg)	1V

2時間

側②	[:]
ソリタT3	500mL

2時間

側③	[:]
ソリタT3	500mL

本体②	[:]
生理食塩液	500mL
フルオロウラシル	0 mg
(400mg/m ²)	

12時間

Day3:

本体①	[:]
生理食塩液	500mL
フルオロウラシル	0 mg
(400mg/m ²)	

12時間

30分

側①	[:]
生理食塩液	100mL
デキサート(6.6mg)	1V

2時間

側②	[:]
ソリタ T 3	500mL

2時間

側③	[:]
ソリタ T 3	500mL

本体②	[:]
生理食塩液	500mL
フルオロウラシル	0 mg
(400mg/m ²)	

12時間

Day4:

本体①	[:]
生理食塩液	500mL
フルオロウラシル	0 mg
(400mg/m ²)	

12時間

30分

側①	[:]
生理食塩液	100mL
デキサート(6.6mg)	1V

2時間

側②	[:]
ソリタ T 3	500mL

2時間

側③	[:]
ソリタ T 3	500mL

本体②	[:]
生理食塩液	500mL
フルオロウラシル	0 mg
(400mg/m ²)	

12時間

Day5:

本体①	[:]
生理食塩液	500mL
フルオロウラシル	0 mg
(400mg/m ²)	

12時間

30分

側①	[:]
生理食塩液	100mL
デキサート(6.6mg)	1V

2時間

側②	[:]
ソリタ T 3	500mL

2時間

側③	[:]
ソリタ T 3	500mL

本体②	[:]
生理食塩液	500mL
フルオロウラシル	0 mg
(400mg/m ²)	

12時間

※最後に生理食塩液100mlで5分フラッシュする