

患者名 様
ID

化学療法名 **インジウムイブリツモマブチウキセタン(ゼヴァリンインジウム)**
(集積部位確認用)

指示医師:

治療日 ~

化学療法指示	第1治療日 1月0日	治療実施																																																																																																																																																															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Regimen Rituximab 250 mg/m² day 1 ゼヴァリン・インジウム 130 MBq day 1 Rituximab 250 mg/m² day 8 ゼヴァリン・イットリウム 14.8 MBq/kg day 1 (max 1184 MBq/b) イットリウムはPit10-15万の時 11.1MBq/kgに減量 </div> <p>① 薬剤投与量決定</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>年齢</td><td> </td><td>才</td></tr> <tr><td>身長</td><td> </td><td>cm</td></tr> <tr><td>実体重</td><td> </td><td>kg</td></tr> <tr><td>標準体重*</td><td>0.0</td><td>kg</td></tr> <tr><td>体表面積</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>体表面積*</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>採用体表面積</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>年齢係数</td><td> </td><td></td></tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr><th></th><th>算出値</th><th>処方量</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>リツキサン</td><td>0</td><td> mg</td></tr> <tr><td>生食</td><td>0</td><td> ml</td></tr> <tr><td>インジウム</td><td>130</td><td> MBq</td></tr> </tbody> </table> <p>② 内服薬処方</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーワ 3錠 </div>	年齢	 	才	身長	 	cm	実体重	 	kg	標準体重*	0.0	kg	体表面積	0.00	m ²	体表面積*	0.00	m ²	採用体表面積	0.00	m ²	年齢係数	 			算出値	処方量	リツキサン	0	 mg	生食	0	 ml	インジウム	130	 MBq	<p>ChemoNavi</p> <p style="text-align: center;">1月0日 ↓</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><th>治療日</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr> <tr><td>リツキサン</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr> <tr><td>インジウム</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>イットリウム</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 体調確認 </div> <table style="width: 100%;"> <tr><td>・ 体温 °C</td><td>SpO₂ %</td></tr> <tr><td>・ 血圧 </td><td>脈拍 </td></tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr><td>・ 倦怠感</td><td>有・無</td></tr> <tr><td>・ 労作時息切れ</td><td>有・無</td></tr> <tr><td>・ 鼻汁・鼻閉・咽頭痛</td><td>有・無</td></tr> <tr><td>・ 咳・喀痰</td><td>有・無</td></tr> <tr><td>・ 発疹</td><td>有・無</td></tr> <tr><td>・ 食欲不振</td><td>有・無</td></tr> <tr><td>・ 腹痛・嘔気</td><td>有・無</td></tr> <tr><td>・ 下痢</td><td>有・無</td></tr> <tr><td>・ 便秘</td><td>有・無</td></tr> <tr><td>・ その他体調不良</td><td>有・無</td></tr> </table> <p>看護師署名 </p> <p>治療実施 可 不可</p> <p>医師署名 </p>	治療日	1	2	3	4	5	6	7	8	リツキサン	●							●	インジウム	●								イットリウム								●	・ 体温 °C	SpO ₂ %	・ 血圧 	脈拍 	・ 倦怠感	有・無	・ 労作時息切れ	有・無	・ 鼻汁・鼻閉・咽頭痛	有・無	・ 咳・喀痰	有・無	・ 発疹	有・無	・ 食欲不振	有・無	・ 腹痛・嘔気	有・無	・ 下痢	有・無	・ 便秘	有・無	・ その他体調不良	有・無	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> RI標識成功後、医師より実施の連絡 </div> <p>① ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーワ 3錠 内服</p> <p>② ソルコーテフ 100 mg 生食 100 ml 点滴、30分</p> <p>③ リツキサン 0 mg 生食 0 ml 滴下速度の設定</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> B設定のみ B設定 100ml/h (1時間) ↓ 200ml/h </div> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr><th colspan="2">リツキサン点滴経過</th><th>時間</th></tr> <tr><th></th><th>脈拍</th><th>血圧</th><th>SpO₂</th><th>体温</th><th>痒み</th><th>発疹</th><th>嘔気</th><th>胸苦</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>前</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>：</td></tr> <tr><td>30分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>：</td></tr> <tr><td>60分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>：</td></tr> <tr><td>120分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>：</td></tr> <tr><td>終了時</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>有・無</td><td>：</td></tr> </tbody> </table> <p>・ 血管痛 有・無 ・ 点滴漏れ 有・無 ・ その他の問題 有・無</p> <p style="text-align: right;">実施看護師署名: </p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 終了後、担当医へ報告 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> RI室へ移動 (点滴ルートは置いておく) </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">リツキサン終了後4時間以内にゼヴァリン投与</p> <p style="text-align: center;">RI室にて</p> <p>①放射濃度確認 ②インフュージョンポンプ・0.22μ 静脈フィルター(蛋白低吸着性)準備 ③ ゼヴァリン・インジウム MBq 10分間かけて静注 ④生食フラッシュ ⑤過敏反応確認</p>	リツキサン点滴経過		時間		脈拍	血圧	SpO ₂	体温	痒み	発疹	嘔気	胸苦		前					有・無	有・無	有・無	有・無	：	30分					有・無	有・無	有・無	有・無	：	60分					有・無	有・無	有・無	有・無	：	120分					有・無	有・無	有・無	有・無	：	終了時					有・無	有・無	有・無	有・無	：
年齢	 	才																																																																																																																																																															
身長	 	cm																																																																																																																																																															
実体重	 	kg																																																																																																																																																															
標準体重*	0.0	kg																																																																																																																																																															
体表面積	0.00	m ²																																																																																																																																																															
体表面積*	0.00	m ²																																																																																																																																																															
採用体表面積	0.00	m ²																																																																																																																																																															
年齢係数	 																																																																																																																																																																
	算出値	処方量																																																																																																																																																															
リツキサン	0	 mg																																																																																																																																																															
生食	0	 ml																																																																																																																																																															
インジウム	130	 MBq																																																																																																																																																															
治療日	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																									
リツキサン	●							●																																																																																																																																																									
インジウム	●																																																																																																																																																																
イットリウム								●																																																																																																																																																									
・ 体温 °C	SpO ₂ %																																																																																																																																																																
・ 血圧 	脈拍 																																																																																																																																																																
・ 倦怠感	有・無																																																																																																																																																																
・ 労作時息切れ	有・無																																																																																																																																																																
・ 鼻汁・鼻閉・咽頭痛	有・無																																																																																																																																																																
・ 咳・喀痰	有・無																																																																																																																																																																
・ 発疹	有・無																																																																																																																																																																
・ 食欲不振	有・無																																																																																																																																																																
・ 腹痛・嘔気	有・無																																																																																																																																																																
・ 下痢	有・無																																																																																																																																																																
・ 便秘	有・無																																																																																																																																																																
・ その他体調不良	有・無																																																																																																																																																																
リツキサン点滴経過		時間																																																																																																																																																															
	脈拍	血圧	SpO ₂	体温	痒み	発疹	嘔気	胸苦																																																																																																																																																									
前					有・無	有・無	有・無	有・無	：																																																																																																																																																								
30分					有・無	有・無	有・無	有・無	：																																																																																																																																																								
60分					有・無	有・無	有・無	有・無	：																																																																																																																																																								
120分					有・無	有・無	有・無	有・無	：																																																																																																																																																								
終了時					有・無	有・無	有・無	有・無	：																																																																																																																																																								

