

患者名 様
ID

化学療法名 JALSG-ALL202U

指示医師名: _____

第 コース

治療開始日

化学療法指示	第1日	第2日	第3日	第4日	第6日	第8日	第10日	
① 薬剤投与量決定 年齢 才 身長 cm 実体重 kg 標準体重* 0.0 kg 体表面積 0.00 m ² 体表面積* 0.00 m ² 採用体表面積 0.00 m ² 年齢係数 心係数 前治療係数 算出値 処方量 ビンクリスチン 0.0 mg L-アスパラギナーゼ 0 U ピラルピシン 0.0 mg シクロホスファミド 0.0 mg デキサメタゾン 0.0 mg	生食 100 mL ルートキープ 10:00 デキサート 0.0 mg 生食 50 mL 点滴 全開で滴下 グラニセロン 1 キット 点滴 全開で滴下 オンコピン 0 mg 生食 50 mL 点滴 全開で滴下 ピノルピン 0.0 mg 生食 50 mL 点滴 30分	生食 100 mL ルートキープ 10:00 デキサート 0.0 mg 生食 50 mL 点滴 全開で滴下 グラニセロン 1 キット 点滴 全開で滴下 ピノルピン 0.0 mg 生食 50 mL 点滴 30分	生食 100 mL ルートキープ 10:00 デキサート 0.0 mg 生食 50 mL 点滴 全開で滴下 グラニセロン 1 キット 点滴 全開で滴下 エドキシタン 0 mg 生食 250 mL 点滴 60分	デキサート 0.0 mg 生食 50 mL 点滴 全開で滴下 第5日	デキサート 0.0 mg 生食 50 mL 点滴 全開で滴下 第7日	生食 100 mL ルートキープ 10:00 グラニセロン 1 キット 点滴 全開で滴下 オンコピン 0.0 mg 生食 50 mL 点滴 全開で滴下 ロイナーゼ 0 U 生食 500 mL 点滴 4時間	生食 100 mL ルートキープ 10:00 グラニセロン 1 キット 点滴 全開で滴下 ロイナーゼ 0 U 生食 500 mL 点滴 4時間	
	第12日	第14日	第15日	第16日	第18日	第20日	第22日	
	生食 100 mL ルートキープ 10:00 グラニセロン 1 キット 点滴 全開で滴下 ロイナーゼ 0 U 生食 500 mL 点滴 4時間	生食 100 mL ルートキープ 10:00 グラニセロン 1 キット 点滴 全開で滴下 ロイナーゼ 0 U 生食 500 mL 点滴 4時間	生食 100 mL ルートキープ 10:00 グラニセロン 1 キット 点滴 全開で滴下 オンコピン 0.0 mg 生食 50 mL 点滴 全開で滴下	生食 100 mL ルートキープ 10:00 グラニセロン 1 キット 点滴 全開で滴下 ロイナーゼ 0 U 生食 500 mL 点滴 4時間	生食 100 mL ルートキープ 10:00 グラニセロン 1 キット 点滴 全開で滴下 ロイナーゼ 0 U 生食 500 mL 点滴 4時間	生食 100 mL ルートキープ 10:00 グラニセロン 1 キット 点滴 全開で滴下 ロイナーゼ 0 U 生食 500 mL 点滴 4時間	生食 100 mL ルートキープ 10:00 グラニセロン 1 キット 点滴 全開で滴下 オンコピン 0.0 mg 生食 50 mL 点滴 全開で滴下 ロイナーゼ 0 U 生食 500 mL 点滴 4時間	
	今回は 第 1 2 3 4 サイクル Regimen Vincristine 1.5 mg/m ² day1,8,15,22 L-asparaginase 6000 U/m2 day8,10,12,14,16,18,20,22 Pirarubicin 25 mg/m ² , day 1,2 Cyclophosphamide 1200 mg/m ² , day3 Dexamethasone 10mg/m ² day1~7							