

化学療法指示書


IRIS + Bmab

療法

適応疾患
進行・再発大腸がん

患者ID				
患者氏名			指示医師	
身長	cm	体重	kg	体表面積
				m ²

投与スケジュール



Day1:	月	日
Day15:	月	日

生理食塩液 100mL
ルート確保・フラッシュ用

内服薬Day1、15
イメド(アプレピタント)125mg 1cap
投与開始時に内服

[]

本体①	
グラニセトン注(3mg/50mL)	1袋
デキサート(6.6mg)	1V
アトロピン硫酸塩(0.5mg)	1A

内服薬 Day2、Day16から
イメド(アプレピタント)80mg 1cap × 2日間
デカドロン4mg 2錠 × 3日間
朝食後

[]

本体②	
生理食塩液100mL	1V
ペバシズマブBS ()mg	
(総量100mLにする)	(5mg/kg)

1回目 90分
2回目 60分
3回目以降 30分

S-1投与量(1日投与量)	
体表面積(m ²)	1日投与量
1.25未満	80mg
1.25以上 1.50未満	100mg
1.50以上	120mg

《ペバシズマブBS終了後、フラッシュ》
生理食塩液50mL 1V

ペバシズマブBSと
同じ投与速度

[]

本体③	
生理食塩液250mL	1袋
イリノテカン ()mg	

90分