

患者名 様  
ID

化学療法名 DLd療法1サイクル第1週・1000ml

指示医師署名: \_\_\_\_\_

第 1 サイクル 4週毎

治療開始日

化学療法指示	
Regimen	
Daratumumab	16 mg/kg, day 1, 8,15,22
div.Dexamethasone	19.8mg/b, day 1,8,15,22
p.o.Dexamethasone	20mg/b, day 2,9,16,23
Lenalidomide	25 mg/day, day 1-21

① 薬剤投与量決定

年齢  才  
 身長  cm  
 実体重  kg  
 標準体重\*  0.0 kg  
 (実体重を採用)

ダラザレックス用量  mg/kg  
 Dex減量係数   
 eGFR   
 レブラミド用量  mg/day  
 (レブラミドはeGFR依存性に減量する)

治療第1日

今回は 第 1 サイクルの  
第 ① 2 3 4 週

1月0日 ↓

治療日	1	...	8	...	15	...	22
ダラザレックス	●		●		●		●

体温 \_\_\_\_\_ SpO2 \_\_\_\_\_  
 血圧 \_\_\_\_\_ 脈拍 \_\_\_\_\_

倦怠感 有・無  
 労作時息切れ 有・無  
 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無  
 咳・喀痰 有・無  
 発疹 有・無  
 食欲不振 有・無  
 腹痛・嘔気 有・無  
 下痢 有・無  
 便秘 有・無  
 しびれ 有・無

看護師署名 \_\_\_\_\_  
 治療実施 可 不可  
 医師署名 \_\_\_\_\_

自宅で  
 レブラミド 0 cap  
 分1、朝 day1-21

来院後  
 レスタミンコーワ 3錠  
 アセトアミノフェン200mg 1錠  
 アセトアミノフェン300mg 1錠  
 モンテルカスト 1錠

↓  
 デキサート 0 mg  
 生食 50ml  
 15分で点滴(224ml/h)

↓  
 生食 100ml  
 45分で点滴(133ml/h)

↓  
 ダラザレックス 0 ml  
 生食 1000 ml  
 滴下速度の設定

A設定  
 A設定    
 50ml/h (60分)  
 ↓  
 100ml/h (60分)  
 ↓  
 150ml/h (60分)  
 ↓  
 200ml/h

自宅で  
 レナデックス 0錠  
 分1、朝 day 2,9,16,23

算出値	処方量
ダラザレックス 0	<input type="text"/> mg
=	<input type="text"/> ml
デキサート 0	<input type="text"/> mg
レナデックス(4) 0	<input type="text"/> 錠
レブラミド(5) 0	<input type="text"/> cap

ダラザレックスの滴下速度  
 初回投与: 1000mlでA設定  
 2回目: 500mlでA設定  
 3回目以降: 500mlでB設定  
 (infusion reactionの状況による)

ダラザレックスの投与スケジュール  
 第1~2サイクルは毎週投与  
 第3~6サイクルは2週毎投与  
 第7サイクル以降は4週毎投与

ダラザレックス点滴経過

	脈拍	血圧	SpO2	体温	痒み	発疹	嘔気	胸痛	
前					有・無	有・無	有・無	有・無	:
30分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
60分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
120分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
180分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
終了時					有・無	有・無	有・無	有・無	:

・血管痛 有・無  
 ・点滴漏れ 有・無  
 ・その他の問題 有・無

実施看護師署名: \_\_\_\_\_

chemo navi

今回は  
第 ① 2 3 4 5 6 7 8 サイクル

1月0日 ↓

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラザレックス	●							●							●								●					
レブラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
DEXA(div or p.o.)	●	●						●	●						●	●							●	●				

患者名 様  
ID

化学療法名 DLd療法1サイクル第2週

指示医師署名: \_\_\_\_\_


第 1 サイクル 4週毎

治療開始日

化学療法指示	
Regimen	
Daratumumab	16 mg/kg, day 1, 8,15,22
div.Dexamethasone	19.8mg/b, day 1,8,15,22
p.o.Dexamethasone	20mg/b, day 2,9,16,23
Lenalidomide	25 mg/day, day 1-21

治療第8日 1月7日

今回は 第 1 サイクルの  
第 1 ② 3 4 週



① 薬剤投与量決定

年齢  才  
 身長  cm  
 実体重  kg  
 標準体重\*  0.0 kg  
 (実体重を採用)

ダラザレックス用量  mg/kg  
 Dex減量係数   
 eGFR   
 レブラミド用量  mg/day  
 (レブラミドはeGFR依存性に減量する)


	算出値	処方量
ダラザレックス	0	<input type="text"/> mg
	=	<input type="text"/> ml
デキサート	0	<input type="text"/> mg
レナデックス(4)	0	<input type="text"/> 錠
レブラミド(5)	0	<input type="text"/> cap

ダラザレックスの滴下速度  
 初回投与: 1000mlでA設定  
 2回目: 500mlでA設定  
 3回目以降: 500mlでB設定  
 (infusion reactionの状況による)

ダラザレックスの投与スケジュール  
 第1~2サイクルは毎週投与  
 第3~6サイクルは2週毎投与  
 第7サイクル以降は4週毎投与

chemo navi

今回は  
第 ① 2 3 4 5 6 7 8 サイクル



体温 \_\_\_\_\_ SpO2 \_\_\_\_\_  
 血圧 \_\_\_\_\_ 脈拍 \_\_\_\_\_

倦怠感 有・無  
 労作時息切れ 有・無  
 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無  
 咳・喀痰 有・無  
 発疹 有・無  
 食欲不振 有・無  
 腹痛・嘔気 有・無  
 下痢 有・無  
 便秘 有・無  
 しびれ 有・無

看護師署名 \_\_\_\_\_  
 治療実施 可 不可  
 医師署名 \_\_\_\_\_

自宅で  
 レブラミド 0 cap  
 分1、朝 day1-21

来院後  
 レスタミンコーワ 3錠  
 アセトアミノフェン200mg 1 錠  
 アセトアミノフェン300mg 1 錠  
 モンテルカスト 1錠

↓  
 デキサート 0 mg  
 生食 50ml  
 15分で点滴(224ml/h)

↓  
 生食 100ml  
 45分で点滴(133ml/h)

↓  
 ダラザレックス 0 ml  
 生食 500 ml

滴下速度の設定  
 A設定   
 B設定   
 A設定 50ml/h (60分)  
 ↓  
 100ml/h (60分)  
 ↓  
 150ml/h (60分)  
 ↓  
 200ml/h

自宅で  
 レナデックス 0 錠  
 分1、朝 day 2,9,16,23

ダラザレックス点滴経過

	脈拍	血圧	SpO2	体温	痒み	発疹	嘔気	胸痛	
前					有・無	有・無	有・無	有・無	:
30分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
60分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
120分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
180分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
終了時					有・無	有・無	有・無	有・無	:

・血管痛 有・無  
 ・点滴漏れ 有・無  
 ・その他の問題 有・無

実施看護師署名: \_\_\_\_\_

患者名 様  
ID

化学療法名 DLd療法1サイクル第3週

指示医師署名: \_\_\_\_\_

第 1 サイクル 4週毎

治療開始日

化学療法指示	
Regimen	
Daratumumab	16 mg/kg, day 1, 8,15,22
div.Dexamethasone	19.8mg/b, day 1,8,15,22
p.o.Dexamethasone	20mg/b, day 2,9,16,23
Lenalidomide	25 mg/day, day 1-21

① 薬剤投与量決定

年齢  才

身長  cm

実体重  kg

標準体重\*  kg  
(実体重を採用)

ダラザレックス用量  mg/kg


Dex減量係数

eGFR

レブラミド用量  mg/day  
(レブラミドはeGFR依存性に減量する)

治療第15日

今回は 第 1 サイクルの  
第 1 2 ③ 4 週



体温 \_\_\_\_\_ SpO2 \_\_\_\_\_  
血圧 \_\_\_\_\_ 脈拍 \_\_\_\_\_

- 倦怠感 有・無
- 労作時息切れ 有・無
- 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無
- 咳・喀痰 有・無
- 発疹 有・無
- 食欲不振 有・無
- 腹痛・嘔気 有・無
- 下痢 有・無
- 便秘 有・無
- しびれ 有・無

看護師署名 \_\_\_\_\_  
治療実施 可 不可  
医師署名 \_\_\_\_\_

自宅で	
レブラミド	0 cap
分1、朝	day1-21

来院後	
レスタミンコーワ	3錠
アセトアミノフェン200mg	1錠
アセトアミノフェン300mg	1錠
モンテルカスト	1錠

デキサート	0 mg
生食	50ml
15分で点滴(224ml/h)	

生食	100ml
45分で点滴(133ml/h)	

ダラザレックス 0 ml  
生食 500 ml

滴下速度の設定

A設定

B設定

B設定  
100ml/h (60分)  
↓  
150ml/h (60分)  
↓  
200ml/h

自宅で	
レナデックス	0錠
分1、朝	day 2,9,16,23

算出値	処方量
ダラザレックス 0	<input type="text"/> mg
=	<input type="text"/> ml
デキサート 0	<input type="text"/> mg
レナデックス(4) 0	<input type="text"/> 錠
レブラミド(5) 0	<input type="text"/> cap

ダラザレックスの滴下速度  
初回投与: 1000mlでA設定  
2回目: 500mlでA設定  
3回目以降: 500mlでB設定  
(infusion reactionの状況による)

ダラザレックスの投与スケジュール  
第1~2サイクルは毎週投与  
第3~6サイクルは2週毎投与  
第7サイクル以降は4週毎投与

ダラザレックス点滴経過


	脈拍	血圧	SpO2	体温	痒み	発疹	嘔気	胸痛	
前					有・無	有・無	有・無	有・無	:
30分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
60分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
120分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
180分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
終了時					有・無	有・無	有・無	有・無	:

- 血管痛 有・無
- 点滴漏れ 有・無
- その他の問題 有・無

実施看護師署名: \_\_\_\_\_

chemo navi

今回は  
第 ① 2 3 4 5 6 7 8 サイクル



患者名 様  
ID

化学療法名 DLd療法1サイクル第4週

指示医師署名: \_\_\_\_\_

第 1 サイクル 4週毎

治療開始日

化学療法指示	
Regimen	
Daratumumab	16 mg/kg, day 1, 8,15,22
div.Dexamethasone	19.8mg/b, day 1,8,15,22
p.o.Dexamethasone	20mg/b, day 2,9,16,23
Lenalidomide	25 mg/day, day 1-21

治療第22日

今回は 第 1 サイクルの  
第 1 2 3 ④ 週

治療日	1	...	8	...	15	...	22
ダラザレックス	●		●		●		●

① 薬剤投与量決定

年齢  才  
身長  cm  
実体重  kg  
標準体重\*  0.0 kg  
(実体重を採用)

ダラザレックス用量  mg/kg  
Dex減量係数   
eGFR   
レブラミド用量  mg/day  
(レブラミドはeGFR依存性に減量する)

算出値 処方量

ダラザレックス	0	<input type="text"/>	mg
	=	<input type="text"/>	ml
デキサート	0	<input type="text"/>	mg
レナデックス(4)	0	<input type="text"/>	錠
レブラミド(5)	0	<input type="text"/>	cap

ダラザレックスの滴下速度  
初回投与: 1000mlでA設定  
2回目: 500mlでA設定  
3回目以降: 500mlでB設定  
(infusion reactionの状況による)

ダラザレックスの投与スケジュール  
第1~2サイクルは毎週投与  
第3~6サイクルは2週毎投与  
第7サイクル以降は4週毎投与

chemo navi

今回は  
第 ① 2 3 4 5 6 7 8 サイクル

1月0日																												
	↓						↓									↓												
ダラザレックス	●						●									●												
レブラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DEXA(div or p.o.)	●	●					●	●							●	●										●	●	

体温 \_\_\_\_\_ SpO2 \_\_\_\_\_  
血圧 \_\_\_\_\_ 脈拍 \_\_\_\_\_

倦怠感 有・無  
労作時息切れ 有・無  
鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無  
咳・喀痰 有・無  
発疹 有・無  
食欲不振 有・無  
腹痛・嘔気 有・無  
下痢 有・無  
便秘 有・無  
しびれ 有・無

看護師署名 \_\_\_\_\_  
治療実施 可 不可  
医師署名 \_\_\_\_\_

来院後	
レスタミンコーワ	3錠
アセトアミノフェン200mg	1錠
アセトアミノフェン300mg	1錠
モンテルカスト	1錠
↓	
デキサート	0 mg
生食	50ml
15分で点滴(224ml/h)	
↓	
生食	100ml
45分で点滴(133ml/h)	
↓	

ダラザレックス 0 ml  
生食 500 ml  
滴下速度の設定

A設定   
B設定

B設定  
100ml/h (60分)  
↓  
150ml/h (60分)  
↓  
200ml/h

自宅で  
レナデックス 0錠  
分1、朝 day 2,9,16,23

ダラザレックス点滴経過

	脈拍	血圧	SpO2	体温	痒み	発疹	嘔気	胸苦	
前					有・無	有・無	有・無	有・無	:
30分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
60分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
120分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
180分					有・無	有・無	有・無	有・無	:
終了時					有・無	有・無	有・無	有・無	:

・血管痛 有・無  
・点滴漏れ 有・無  
・その他の問題 有・無

実施看護師署名: \_\_\_\_\_

患者名 様  
ID

化学療法名 DLd療法2サイクル目  
第 2 サイクル 4週毎

指示医師名: \_\_\_\_\_

治療開始日

化学療法指示	治療第1日	治療第8日																																																																																																																																
<p>Regimen</p> <p>Daratumumab 16 mg/kg, day 1, 8,15,22 div.Dexamethasone 19.8mg/b, day 1,8,15,22 p.o.Dexamethasone 20mg/b, day 2,9,16,23 Lenalidomide 25 mg/day, day 1-21</p> <p>① 薬剤投与量決定</p> <p>年齢 <input type="text"/> 才 身長 <input type="text"/> cm 実体重 <input type="text"/> kg 標準体重* <input type="text"/> kg (実体重を採用)</p> <p>ダラザレックス用量 <input type="text"/> mg/kg Dex減量係数 <input type="text"/> eGFR <input type="text"/> レブラミド用量 <input type="text"/> mg/day (レブラミドはeGFR依存性に減量する)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>算出値</th> <th>処方量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラザレックス 0</td> <td><input type="text"/> mg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>= <input type="text"/> ml</td> </tr> <tr> <td>デキサート 0</td> <td><input type="text"/> mg</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(4) 0</td> <td><input type="text"/> 錠</td> </tr> <tr> <td>レブラミド(5) 0</td> <td><input type="text"/> 0 cap</td> </tr> </tbody> </table> <p>ダラザレックスの滴下速度 初回投与: 1000mlでA設定 2回目: 500mlでA設定 3回目以降: 500mlでB設定 (infusion reactionの状況による)</p> <p>ダラザレックスの投与スケジュール 第1~2サイクルは毎週投与 第3~6サイクルは2週毎投与 第7サイクル以降は4週毎投与</p> <p>chemo navi</p> <p>今回は</p> <p>第 1 ② 3 4 5 6 7 8 サイクル</p> <p>1月0日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダラザレックス</td> <td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>レブラミド</td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>DEXA(div or p.o.)</td> <td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	算出値	処方量	ダラザレックス 0	<input type="text"/> mg		= <input type="text"/> ml	デキサート 0	<input type="text"/> mg	レナデックス(4) 0	<input type="text"/> 錠	レブラミド(5) 0	<input type="text"/> 0 cap		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	ダラザレックス	●							●							●							●							レブラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							DEXA(div or p.o.)	●	●						●	●						●	●						●	●						<p>体温 _____ SpO2 _____ 血圧 _____ 脈拍 _____</p> <p>倦怠感 有・無 労作時息切れ 有・無 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無 咳・喀痰 有・無 発疹 有・無 食欲不振 有・無 腹痛・嘔気 有・無 下痢 有・無 便秘 有・無 しびれ 有・無</p> <p>看護師署名 _____ 治療実施 可 不可 医師署名 _____</p> <p>自宅 レブラミド 0 cap 分1、朝 day1-21</p> <p>来院後 レスタミンコーワ 3錠 アセトアミノフェン200mg 1錠 アセトアミノフェン300mg 1錠 モンテルカスト 1錠</p> <p>↓</p> <p>デキサート ## mg 生食 50ml 15分で点滴(224ml/h)</p> <p>↓</p> <p>生食 100ml 45分で点滴(133ml/h)</p> <p>↓</p> <p>ダラザレックス 0 ml 生食 500 ml 滴下速度の設定</p> <p>A設定 <input type="checkbox"/> B設定 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>100ml/h (60分) ↓ 150ml/h (60分) ↓ 200ml/h</p>	<p>体温 _____ SpO2 _____ 血圧 _____ 脈拍 _____</p> <p>倦怠感 有・無 労作時息切れ 有・無 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無 咳・喀痰 有・無 発疹 有・無 食欲不振 有・無 腹痛・嘔気 有・無 下痢 有・無 便秘 有・無 しびれ 有・無</p> <p>看護師署名 _____ 治療実施 可 不可 医師署名 _____</p> <p>自宅 レブラミド 0 cap 分1、朝 day1-21</p> <p>来院後 レスタミンコーワ 3錠 アセトアミノフェン200mg 1錠 アセトアミノフェン300mg 1錠 モンテルカスト 1錠</p> <p>↓</p> <p>デキサート 0 mg 生食 50ml 15分で点滴(224ml/h)</p> <p>↓</p> <p>生食 100ml 45分で点滴(133ml/h)</p> <p>↓</p> <p>ダラザレックス 0 ml 生食 500 ml 滴下速度の設定</p> <p>A設定 <input type="checkbox"/> B設定 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>100ml/h (60分) ↓ 150ml/h (60分) ↓ 200ml/h</p>
算出値	処方量																																																																																																																																	
ダラザレックス 0	<input type="text"/> mg																																																																																																																																	
	= <input type="text"/> ml																																																																																																																																	
デキサート 0	<input type="text"/> mg																																																																																																																																	
レナデックス(4) 0	<input type="text"/> 錠																																																																																																																																	
レブラミド(5) 0	<input type="text"/> 0 cap																																																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																						
ダラザレックス	●							●							●							●																																																																																																												
レブラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																												
DEXA(div or p.o.)	●	●						●	●						●	●						●	●																																																																																																											
	治療第15日	治療第22日																																																																																																																																
	<p>体温 _____ SpO2 _____ 血圧 _____ 脈拍 _____</p> <p>倦怠感 有・無 労作時息切れ 有・無 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無 咳・喀痰 有・無 発疹 有・無 食欲不振 有・無 腹痛・嘔気 有・無 下痢 有・無 便秘 有・無 しびれ 有・無</p> <p>看護師署名 _____ 治療実施 可 不可 医師署名 _____</p> <p>自宅 レブラミド 0 cap 分1、朝 day1-21</p> <p>来院後 レスタミンコーワ 3錠 アセトアミノフェン200mg 1錠 アセトアミノフェン300mg 1錠 モンテルカスト 1錠</p> <p>↓</p> <p>デキサート ## mg 生食 50ml 15分で点滴(224ml/h)</p> <p>↓</p> <p>生食 100ml 45分で点滴(133ml/h)</p> <p>↓</p> <p>ダラザレックス 0 ml 生食 500 ml 滴下速度の設定</p> <p>A設定 <input type="checkbox"/> B設定 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>100ml/h (60分) ↓ 150ml/h (60分) ↓ 200ml/h</p>	<p>体温 _____ SpO2 _____ 血圧 _____ 脈拍 _____</p> <p>倦怠感 有・無 労作時息切れ 有・無 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無 咳・喀痰 有・無 発疹 有・無 食欲不振 有・無 腹痛・嘔気 有・無 下痢 有・無 便秘 有・無 しびれ 有・無</p> <p>看護師署名 _____ 治療実施 可 不可 医師署名 _____</p> <p>自宅 レナデックス 0 錠 分1、朝 day 2,9,16,23</p> <p>来院後 レスタミンコーワ 3錠 アセトアミノフェン200mg 1錠 アセトアミノフェン300mg 1錠 モンテルカスト 1錠</p> <p>↓</p> <p>デキサート 0 mg 生食 50ml 15分で点滴(224ml/h)</p> <p>↓</p> <p>生食 100ml 45分で点滴(133ml/h)</p> <p>↓</p> <p>ダラザレックス 0 ml 生食 500 ml 滴下速度の設定</p> <p>A設定 <input type="checkbox"/> B設定 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>100ml/h (60分) ↓ 150ml/h (60分) ↓ 200ml/h</p>																																																																																																																																

※ 自宅  
レナデックス 0 錠  
分1、朝 day 2,9,16,23

患者名 様  
ID

化学療法名 DLd療法3-6サイクル目

指示医師名: \_\_\_\_\_

第 3 サイクル 4週毎

治療開始日

化学療法指示	治療第1日	治療第15日																																																				
<b>Regimen</b> Daratumumab 16 mg/kg, day 1,15 div.Dexamethasone 19.8mg/b, day 1,15 p.o.Dexamethasone 20mg/b, day 2,8,9,16,22,23 Lenalidomide 25 mg/day, day 1-21  ① 薬剤投与量決定 年齢 <input type="text"/> 才 身長 <input type="text"/> cm 実体重 <input type="text"/> kg 標準体重* <input type="text"/> kg (実体重を採用)  ダラザレックス用量 <input type="text"/> mg/kg Dex減量係数 <input type="text"/> eGFR <input type="text"/> レブラミド用量 <input type="text"/> mg/day (レブラミドはeGFR依存性に減量する)	体温 _____ SpO2 _____ 血圧 _____ 脈拍 _____  倦怠感 有・無 労作時息切れ 有・無 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無 咳・喀痰 有・無 発疹 有・無 食欲不振 有・無 腹痛・嘔気 有・無 下痢 有・無 便秘 有・無 しびれ 有・無  看護師署名 _____ 治療実施 可 不可 医師署名 _____	体温 _____ SpO2 _____ 血圧 _____ 脈拍 _____  倦怠感 有・無 労作時息切れ 有・無 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無 咳・喀痰 有・無 発疹 有・無 食欲不振 有・無 腹痛・嘔気 有・無 下痢 有・無 便秘 有・無 しびれ 有・無  看護師署名 _____ 治療実施 可 不可 医師署名 _____																																																				
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">自宅で</th></tr> <tr><td>レブラミド</td><td>0 cap</td></tr> <tr><td>分1、朝</td><td>day1-21</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><th colspan="2">来院後</th></tr> <tr><td>レスタミンコーワ</td><td>3錠</td></tr> <tr><td>アセトアミノフェン200mg</td><td>1錠</td></tr> <tr><td>アセトアミノフェン300mg</td><td>1錠</td></tr> <tr><td>モンテルカスト</td><td>1錠</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>デキサート ##</td><td>mg</td></tr> <tr><td>生食</td><td>50ml</td></tr> <tr><td>15分で点滴(224ml/h)</td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>生食</td><td>100ml</td></tr> <tr><td>45分で点滴(133ml/h)</td><td></td></tr> </table>	自宅で		レブラミド	0 cap	分1、朝	day1-21	来院後		レスタミンコーワ	3錠	アセトアミノフェン200mg	1錠	アセトアミノフェン300mg	1錠	モンテルカスト	1錠	デキサート ##	mg	生食	50ml	15分で点滴(224ml/h)		生食	100ml	45分で点滴(133ml/h)		<table border="1"> <tr><th colspan="2">自宅で</th></tr> <tr><td>レブラミド</td><td>0 cap</td></tr> <tr><td>分1、朝</td><td>day1-21</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><th colspan="2">来院後</th></tr> <tr><td>レスタミンコーワ</td><td>3錠</td></tr> <tr><td>アセトアミノフェン200mg</td><td>1錠</td></tr> <tr><td>アセトアミノフェン300mg</td><td>1錠</td></tr> <tr><td>モンテルカスト</td><td>1錠</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>デキサート 0</td><td>mg</td></tr> <tr><td>生食</td><td>50ml</td></tr> <tr><td>15分で点滴(224ml/h)</td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>生食</td><td>100ml</td></tr> <tr><td>45分で点滴(133ml/h)</td><td></td></tr> </table>	自宅で		レブラミド	0 cap	分1、朝	day1-21	来院後		レスタミンコーワ	3錠	アセトアミノフェン200mg	1錠	アセトアミノフェン300mg	1錠	モンテルカスト	1錠	デキサート 0	mg	生食	50ml	15分で点滴(224ml/h)		生食	100ml	45分で点滴(133ml/h)	
自宅で																																																						
レブラミド	0 cap																																																					
分1、朝	day1-21																																																					
来院後																																																						
レスタミンコーワ	3錠																																																					
アセトアミノフェン200mg	1錠																																																					
アセトアミノフェン300mg	1錠																																																					
モンテルカスト	1錠																																																					
デキサート ##	mg																																																					
生食	50ml																																																					
15分で点滴(224ml/h)																																																						
生食	100ml																																																					
45分で点滴(133ml/h)																																																						
自宅で																																																						
レブラミド	0 cap																																																					
分1、朝	day1-21																																																					
来院後																																																						
レスタミンコーワ	3錠																																																					
アセトアミノフェン200mg	1錠																																																					
アセトアミノフェン300mg	1錠																																																					
モンテルカスト	1錠																																																					
デキサート 0	mg																																																					
生食	50ml																																																					
15分で点滴(224ml/h)																																																						
生食	100ml																																																					
45分で点滴(133ml/h)																																																						
<table border="1"> <tr><th colspan="2">算出値</th><th colspan="2">処方量</th></tr> <tr><td>ダラザレックス</td><td>0</td><td><input type="text"/></td><td>mg</td></tr> <tr><td></td><td>=</td><td><input type="text"/></td><td>ml</td></tr> <tr><td>デキサート</td><td>0</td><td><input type="text"/></td><td>mg</td></tr> <tr><td>レナデックス(4)</td><td>0</td><td><input type="text"/></td><td>錠</td></tr> <tr><td>レブラミド(5)</td><td>0</td><td><input type="text"/></td><td>cap</td></tr> </table> ダラザレックスの滴下速度 初回投与: 1000mlでA設定 2回目: 500mlでA設定 3回目以降: 500mlでB設定 (infusion reactionの状況による)  ダラザレックスの投与スケジュール 第1~2サイクルは毎週投与 第3~6サイクルは2週毎投与 第7サイクル以降は4週毎投与	算出値		処方量		ダラザレックス	0	<input type="text"/>	mg		=	<input type="text"/>	ml	デキサート	0	<input type="text"/>	mg	レナデックス(4)	0	<input type="text"/>	錠	レブラミド(5)	0	<input type="text"/>	cap	<table border="1"> <tr><th colspan="2">自宅で</th></tr> <tr><td>レナデックス</td><td>0錠</td></tr> <tr><td>分1、朝</td><td>day 2,8,9,16,22,23</td></tr> </table>	自宅で		レナデックス	0錠	分1、朝	day 2,8,9,16,22,23																							
算出値		処方量																																																				
ダラザレックス	0	<input type="text"/>	mg																																																			
	=	<input type="text"/>	ml																																																			
デキサート	0	<input type="text"/>	mg																																																			
レナデックス(4)	0	<input type="text"/>	錠																																																			
レブラミド(5)	0	<input type="text"/>	cap																																																			
自宅で																																																						
レナデックス	0錠																																																					
分1、朝	day 2,8,9,16,22,23																																																					

	<table border="1"> <tr><th colspan="2">自宅で</th></tr> <tr><td>レナデックス</td><td>0錠</td></tr> <tr><td>分1、朝</td><td>day 2,8,9,16,22,23</td></tr> </table>	自宅で		レナデックス	0錠	分1、朝	day 2,8,9,16,22,23
自宅で							
レナデックス	0錠						
分1、朝	day 2,8,9,16,22,23						

chemo navi

今回は

第1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28															
1月0日																																										
ダラザレックス	●														●																											
レブラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																					
DEXA(div or p.o.)	●	●						●	●					●	●							●	●																			

患者名 \_\_\_\_\_ 様  
ID \_\_\_\_\_

化学療法名 DLd療法7サイクル目以降

指示医師名: \_\_\_\_\_

第 **7** サイクル 4週毎

治療開始日

化学療法指示 2017年11月5日

治療第1日

Regimen

Daratumumab 16mg/kg, day 1  
div.Dexamethasone 19.8mg/b, day 1  
p.o.Dexamethasone 20mg/b, day 2,8,9,15,16,22,23  
Lenalidomide 25 mg/day, day 1-21

① 薬剤投与量決定

年齢  才  
身長  cm  
実体重  kg  
標準体重\* 0.0 kg  
(実体重を採用)

ダラザレックス用量  mg/kg  
Dex減量係数   
eGFR   
レブラミド用量  mg/day  
(レブラミドはeGFR依存性に減量する)

体温 \_\_\_\_\_ SpO2 \_\_\_\_\_  
血圧 \_\_\_\_\_ 脈拍 \_\_\_\_\_

倦怠感 有・無  
労作時息切れ 有・無  
鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無  
咳・喀痰 有・無  
発疹 有・無  
食欲不振 有・無  
腹痛・嘔気 有・無  
下痢 有・無  
便秘 有・無  
しびれ 有・無

看護師署名 \_\_\_\_\_  
治療実施 可 不可  
医師署名 \_\_\_\_\_

自宅で  
レブラミド 0 cap  
分1、朝 day1-21

来院後  
レスタミンコーワ 3錠  
アセトアミノフェン200mg 1錠  
アセトアミノフェン300mg 1錠  
モンテルカスト 1錠

↓  
デキサート ## mg  
生食 50ml  
15分で点滴(224ml/h)

↓  
生食 100ml  
45分で点滴(133ml/h)

↓  
ダラザレックス 0 ml  
生食 500 ml  
滴下速度の設定

A設定   
B設定

B設定  
100ml/h (60分)  
↓  
150ml/h (60分)  
↓  
200ml/h

自宅で  
レナデックス 0錠  
分1、朝 day 2,8,9,15,16,22,23

算出値 処方量

ダラザレックス 0  mg  
=  ml  
デキサート 0  mg  
レナデックス(4) 0  錠  
レブラミド(5) 0  cap

ダラザレックスの滴下速度  
初回投与: 1000mlでA設定  
2回目: 500mlでA設定  
3回目以降: 500mlでB設定  
(infusion reactionの状況による)

ダラザレックスの投与スケジュール  
第1~2サイクルは毎週投与  
第3~6サイクルは2週毎投与  
第7サイクル以降は4週毎投与

chemo navi

今回は

第 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ⑦ | 8 | サイクル

1月0日

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラザレックス	●																												
レブラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
DEXA(div or p.o.)	●	●						●	●						●	●						●	●						