

患者名  
ID

様

レジメン名 リツキシマブ単剤(ITP)

治療日

## ChemoNavi

薬品名※()は成分名	投与量	投与日
リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15,22

投与サイクル数	1サイクル
総投与時間	A設定:約4時間 B設定:約3時間

血管外漏出リスク	リツキシマブ:不明
その他必要薬剤	ロキソプロフェン60mg 1錠 レスタミンコーワ10mg 3錠

投与時の注意事項	<p>・day1、8、15、22: リツキシマブによるインフュージョンリアクション予防のため、点滴開始時にロキソプロフェン60mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を内服</p>
備考欄	

治療内容  
day1,8,15,22

## \* 内服

- ① ロキソプロフェン 1錠  
レスタミンコーワ 3錠  
内服

 A設定  B設定

## \* 点滴

- ② 生理食塩液 100 ml  
ルート確保・フラッシュ用

- ③ 生理食塩液 100 ml  
ソル・コーテフ 100 mg  
点滴、30分

- ④ 生理食塩液 ml  
リツキシマブ 375 mg/m<sup>2</sup>  
滴下速度の設定

## A設定

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 50ml/h ↓<br>(30分)  | 250ml/h<br>(30分) |
| 100ml/h ↓<br>(30分) | 300ml/h<br>(30分) |
| 150ml/h ↓<br>(30分) | 350ml/h<br>(30分) |
| 200ml/h ↓<br>(30分) | 400ml/h          |

## B設定

- ② 生理食塩液 100 ml  
ルート確保・フラッシュ用

- ③ 生理食塩液 100 ml  
ソル・コーテフ 100 mg  
点滴、30分

- ④ 生理食塩液 ml  
リツキシマブ 375 mg/m<sup>2</sup>  
滴下速度の設定

## B設定

- |                  |   |
|------------------|---|
| 100ml/h<br>(30分) | ↓ |
| 200ml/h<br>(30分) | ↓ |
| 300ml/h<br>(30分) | ↓ |
| 400ml/h          |   |