

化学療法指示書

CDDP＋CPT-11（ショートハイトレーション） 4週毎

| | | | | | |
|-------|-------|------|-------------------------|------|---------------------|
| 患者ID | | | | | |
| 患者氏名 | | | | 指示医師 | |
| 身長 | cm | 体重 | kg | 体表面積 | 0.00 m ² |
| 血清Cr: | mg/dl | Ccr: | ml/min(Cockcroft-Gault) | | |

適応疾患
小細胞肺癌

CDDP(cisplatin、シスプラチン) 60mg/m² = () mg/body day1
 CPT-11 (irinotecan、イリノテカン塩酸塩) 60mg/m² = () mg/body day1,8,15


※内服薬

Day1: アプレピタント(125mg) 1cap ルートキープ時に
 Day2,3: アプレピタント(80mg) 1cap 朝食後
 Day2~4: デカドロン4mg 2錠 朝食後

コース目 月 日(day1)

* 点滴前に水分(水、茶など) 1000mL摂取する

生理食塩液100mL ルート確保・フラッシュ用



コース目 月 日 (day8) 月 日 (day15)

生理食塩液100mL ルート確保・フラッシュ用



| 第1コースday1開始基準 | 第2コース以降day1開始基準 |
|---|---|
| PS:0-1 | PS:0-1 |
| NEU: ≥2000 | NEU: ≥2000 |
| Hb: ≥9.0 | |
| PLT: ≥100000 | PLT: ≥100000 |
| AST/ALT ≤100/112(肝臓に腫瘍なし) | AST/ALT ≤100/112(肝臓に腫瘍なし) |
| AST/ALT ≤200/225(肝臓に腫瘍あり) | AST/ALT ≤200/225(肝臓に腫瘍あり) |
| クレアチニンが正常値以下 | クレアチニンが正常値以下 |
| 予測クレアチニン・クリアランスまたは 24時間クレアチニン・クリアランス ≥45mL/min | 予測クレアチニン・クリアランスまたは 24時間クレアチニン・クリアランス ≥45mL/min |
| 開始24時間以内に下痢がない | 開始24時間以内に下痢がない |
| 感染を伴う38度以上の発熱がない | 感染を伴う38度以上の発熱がない |

day8, 15投与基準

| |
|---------------------------|
| PS:0-1 |
| NEU: ≥1500 |
| PLT: ≥75000 |
| AST/ALT ≤100/112(肝臓に腫瘍なし) |
| AST/ALT ≤200/225(肝臓に腫瘍あり) |
| 開始24時間以内に下痢がない |
| 感染を伴う38度以上の発熱がない |

◆化学療法の休止もしくは投与量変更の基準

| | CDDP | CPT-11 |
|--------------------------|------|-------------------------|
| NEU < 500/μL | 変更なし | 50mg/m ² へ減量 |
| PLT < 50000/μL | 変更なし | 50mg/m ² へ減量 |
| NEU < 1000/μL + 38度以上の発熱 | 変更なし | 50mg/m ² へ減量 |
| 下痢 ≥ G3 または 入院を要する下痢 | 変更なし | 50mg/m ² へ減量 |
| T-Bil > 2.0mg/dL | 変更なし | 50mg/m ² へ減量 |
| 粘膜炎 ≥ G3 | 変更なし | 50mg/m ² へ減量 |

◆嘔気時:(開始後28日目)まで 適宜下記を投与

- 1) グラニセトロン注(3mg/50mL) 1袋 + エリーテン(10mg) 1A 点滴静注(30分) 1日2回まで
- 2) 生食100mL + デキサート(6.6mg) 1A + エリーテン(10mg) 1A 点滴静注(60分) 1日1回まで

◆下痢時:(開始後28日目)まで 適宜下記を投与

- 1) ロペミン 3CP 分3
- 2) コデインリン酸1% 3g 分3