

レジメン名 **イノツマブオゾガマイシン**

対象疾患 **CD22陽性再発・難治性急性リンパ性白血病**

薬品名※()は成分名			治療内容																																													
			day1	day8	day15																																											
薬品名※()は成分名	投与量	投与日																																														
ベスボンサ (イノツマブオゾガマイシン)	0.5mg/m ²	day1,8,15																																														
※ただし非寛解時のみday1のみ0.8mg/m ²																																																
<p>① 薬剤投与量決定</p> <table border="1"> <tr><td>年齢</td><td></td><td>才</td></tr> <tr><td>身長</td><td></td><td>cm</td></tr> <tr><td>実体重</td><td></td><td>kg</td></tr> <tr><td>標準体重*</td><td>0.0</td><td>kg</td></tr> <tr><td>体表面積</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>体表面積*</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>採用体表面積</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>年齢係数</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>心係数</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>前治療係数</td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><th colspan="2">算出値</th><th>処方量</th></tr> <tr><td>ベスボンサ</td><td>0.00</td><td>mg</td></tr> <tr><td>生食</td><td>50</td><td>ml</td></tr> </table> <p>② 内服薬処方</p> <table border="1"> <tr><td>ロキソプロフェン</td><td>1錠</td></tr> <tr><td>レスタミンコーワ</td><td>3錠</td></tr> </table>			年齢		才	身長		cm	実体重		kg	標準体重*	0.0	kg	体表面積	0.00	m ²	体表面積*	0.00	m ²	採用体表面積	0.00	m ²	年齢係数			心係数			前治療係数			算出値		処方量	ベスボンサ	0.00	mg	生食	50	ml	ロキソプロフェン	1錠	レスタミンコーワ	3錠			
年齢		才																																														
身長		cm																																														
実体重		kg																																														
標準体重*	0.0	kg																																														
体表面積	0.00	m ²																																														
体表面積*	0.00	m ²																																														
採用体表面積	0.00	m ²																																														
年齢係数																																																
心係数																																																
前治療係数																																																
算出値		処方量																																														
ベスボンサ	0.00	mg																																														
生食	50	ml																																														
ロキソプロフェン	1錠																																															
レスタミンコーワ	3錠																																															
投与サイクル数	造血管細胞移植(HSCT)予定:3クールまで HSCT予定でない場合:6クールまで																																															
総投与時間	1時間30分																																															
血管外漏出リスク	ベスボンサ:不明																																															
投与時の注意事項	<p>・インフュージョンリアクション予防のため、ロキソプロフェン60mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠をルートキープ時に内服</p> <p>・ベスボンサ:点滴ボトル要遮光(ルートは遮光不要)、要フィルター付きルート</p>		<p>day1</p> <p>① ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーワ 3錠 内服</p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>③ ソルコーテフ 100 mg 生理食塩液 100 ml 点滴、30分</p> <p>↓</p> <p>④ ベスボンサ mg (点滴ボトル遮光・要フィルター付ルート) 生理食塩液 50 ml 点滴、1時間</p>	<p>day8</p> <p>① ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーワ 3錠 内服</p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>③ ソルコーテフ 100 mg 生理食塩液 100 ml 点滴、30分</p> <p>↓</p> <p>④ ベスボンサ mg (点滴ボトル遮光・要フィルター付ルート) 生理食塩液 50 ml 点滴、1時間</p>	<p>day15</p> <p>① ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーワ 3錠 内服</p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>③ ソルコーテフ 100 mg 生理食塩液 100 ml 点滴、30分</p> <p>↓</p> <p>④ ベスボンサ mg (点滴ボトル遮光・要フィルター付ルート) 生理食塩液 50 ml 点滴、1時間</p>																																											
ChemoNavi																																																
治療日	1	8	15	28(21)																																												
ベスボンサ	●	●	●																																													
※投与間隔:1クール目のみ21日間 2クール目以降28日間			備考欄																																													