

がん化学療法指示書

登録番号 231

作成日 2019/1/9

レジメン名	Bmab+Atezolizumab
診療科・対象疾患	(呼)非扁平上皮非小細胞肺癌
投与間隔	3週間
投与サイクル数	PDIになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg	day1
ペハシズマブBS	ペハシズマブBS	15mg/kg	day1

	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール													
							day1													day21
治療内容	注射	Rp1	生理食塩液	100ml	任意	ルート確保・フラッシュ用	●													
		Rp2	生理食塩液	250ml	60分※1	点滴静注メイン	●													
		癌	テセントリク(アテゾリズマブ)	1200mg																
		Rp3	生理食塩液	50ml	15分	点滴静注メイン 経過観察用	●													
		Rp3	生理食塩液	100ml	90分※2	点滴静注メイン	●													
		癌	ペハシズマブBS	15mg/kg		総量100mlにする														
内服																				
その他必要薬剤																				
総投与時間	総投与時間:1時間15分																			
血管外漏出リスク	テセントリク(アテゾリズマブ): 不明 ペハシズマブBS: 非壊死性抗がん剤																			
投与時の注意事項	テセントリク(アテゾリズマブ)はフィルター付きルート要 ※1・テセントリク(アテゾリズマブ)の投与速度 初回投与の忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる ※2・ペハシズマブBSの投与速度 初回投与の忍容性が良好であれば2回目の投与時間は60分、3回目以降は30分まで短縮できる																			
備考欄	Infusion Reaction経験例では、次回より投与30分前に以下薬剤で前処置を行う。 レスタミンコーワ10mg 5錠 アセトアミノフェン300mg 2錠																			