がん化学療法指示書

登録番号 234 作成日 2019/1/9

レジメン名	PEM+Pembrolizumab				
診療科・対象疾患	(呼)非扁平上皮非小細胞肺癌				
投与間隔	3週毎				
投与サイクル数	PDになるまで				

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	Day1
ペメトレキセド	ペメトレキセド	500mg/m2	Day1

		滴	抗					投与スケジュール						
		下順	癌剤		投与量	時間	投与方法						day2	
		Rp1	ЯΊ	生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	•	+		+			_
		TOT			TOOME	工柜	ルールドンフランエバ							
		Rp2		生理食塩液	100mL	15分	点滴静注メイン	•			1			
				デキサート注(6.6mg)	1瓶		711171717							
					- 7,124									
		Rp3	癌	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200mg	30分	点滴静注メイン	•						
				生理食塩液	100mL									
		Rp4		生理食塩液	50mL	15分	点滴静注メイン	•						
							経過観察用							
	注													
治	射	Rp5	癌	ペメトレキセド	500mg/m2	10分	点滴静注メイン							
療		-		生理食塩液	100mL									
内				総量100mLにする				1						
容														
_								-			-			
								-						
								+			-			
								+ +						
								+ +						
								+						
	内服											<u> </u>	•	
その 必要	服他	•葉酢	隻:1	Iン(デキサメタゾン)4mg:2錠 朝食 日1回0.5mg(パンビタン末1g)を初回 B12:1mg(メチコバール500μg2A)?]治療前の7日	前から服								
必要	他藥剤	•葉酢 •ビタ	g:1 ミン	日1回0.5mg(パンビタン末1g)を初回]治療前の7日	前から服								
必要 総投与 血管外	服 他剤 間 出	・葉酢・ビタ総投キイ)	g:1 ミン 与時	日1回0.5mg(パンビタン末1g)を初回 B12:1mg(メチコバール500μg2A)? 時間:1時間10分 ーダ(ペムブロリズマブ):非壊死性!]治療前の7日₹ を初回治療1週	前から服								
必要 発	服 他剤 間 出	・葉酢・ビタ総投キイ)	g:1 ミン 与時	日1回0.5mg(パンビタン末1g)を初回 B12:1mg(メチコバール500μg2A)? f間:1時間10分]治療前の7日₹ を初回治療1週	前から服								
必要総位投与外ス与りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり<	服他剤間出の	· 葉酥 ・ビタ 総投 キペ キイ	俊ミ 与ールレール・	日1回0.5mg(パンビタン末1g)を初回 B12:1mg(メチコバール500μg2A)? 時間:1時間10分 ーダ(ペムブロリズマブ):非壊死性!	□治療前の7日i を初回治療1週 抗がん剤 ー付きルート要	前から服間前およ	:び以降は3サイクル(9週)毎1	こ筋肉注	·射	3)				
必要 総投 管リ サス サス	服をおいています。他薬をは、一般をは、一般をは、一般をは、一般をは、一般をは、一般をは、一般をは、一般	· 葉酢 ・ビ 総 キペ キペ キペ	と リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	日1回0.5mg(パンビタン末1g)を初回 B12:1mg(メチコバール500μg2A)を 時間:1時間10分 ーダ(ペムブロリズマブ):非壊死性が ドセド:非壊死性抗がん剤 ーダ(ペムブロリズマブ)はフィルター ドセドはNSAIDSとの併用は注意(ペ	1治療前の7日iを初回治療1週 ががん剤 一付きルート要メトレキセドの	前から服間前およる	び以降は3サイクル(9週)毎1	こ筋肉注	生があ					
必要 総投 管リ サス サス	服をおいています。他薬をは、一般をは、一般をは、一般をは、一般をは、一般をは、一般をは、一般をは、一般	· 葉酢 ・ビ 総 お ペ ト ペ ト イ リ ト パ ト パ ト パ ト パ ト パ ト パ ト パ り れ り れ り れ り れ り れ り れ り れ り れ り れ り	俊:11ン 時 ル・1 ル・1 いし いし	日1回0.5mg(パンビタン末1g)を初回 B12:1mg(メチコバール500μg2A)? 時間:1時間10分 ーダ(ペムブロリズマブ):非壊死性打ドセド:非壊死性抗がん剤	1治療前の7日iを初回治療1週 ががん剤 一付きルート要メトレキセドの	前から服間前およる	び以降は3サイクル(9週)毎1	こ筋肉注	生があ			場合に	it、投	2.5
必要総位投与外ス与りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり<	服他剤間出の項	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ど 総 と や や れ ト れ ト れ ト れ れ ト れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ れ	俊ミ 与 ルレー ルレー ionを ionsに対する	日1回0.5mg(パンビタン末1g)を初回 B12:1mg(メチコバール500 μ g2A) a 時間:1時間10分 ーダ(ペムブロリズマブ):非壊死性! トセド:非壊死性抗がん剤 ーダ(ペムブロリズマブ)はフィルター トセドはNSAIDSとの併用は注意(ペ Reaction Grade2の場合、キイトル	治療前の7日 を初回治療1週 抗がん剤 一付きルート要 メトレキセドの 一ダ(ペムブロ	前から服よの中濃度のできます。	び以降は3サイクル(9週)毎1 が増加し副作用が増強され)の投与を直ちに中止する。	こ筋肉注	生があ			合に	は、投	