

レジメン名 **ブリナツモマブ**

対象疾患 **再発・難治性B細胞性急性リンパ性白血病**

ChemoNavi		治療内容																													
<p>体重45kg以上の患者の場合</p> <table border="1"> <tr> <th>薬品名※()は成分名</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> <tr> <td>ビーリンサイト (ブリナツモマブ)</td> <td>28 μg/body/日</td> <td>day1-28</td> </tr> </table> <p>※1サイクル目のday1-7のみ9 μg/body/日</p> <p>体重45kg未満の患者の場合</p> <table border="1"> <tr> <th>薬品名※()は成分名</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> <tr> <td>ビーリンサイト (ブリナツモマブ)</td> <td>15 μg/m²/日</td> <td>day1-28</td> </tr> </table> <p>※1サイクル目のday1-7のみ5 μg/m²/日</p> <p>10ml/h・24時間、24時間毎に残破棄</p>	薬品名※()は成分名	投与量	投与日	ビーリンサイト (ブリナツモマブ)	28 μ g/body/日	day1-28	薬品名※()は成分名	投与量	投与日	ビーリンサイト (ブリナツモマブ)	15 μ g/m ² /日	day1-28	<p>投与サイクル数 寛解導入・地固め療法として5サイクル、維持療法として4サイクルの計9サイクルまで</p> <p>総投与時間 24時間連日</p> <p>血管外漏出リスク 非壊死性抗がん剤</p> <p>投与時の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・神経学的事象、サイトカイン放出症候群、腫瘍崩壊症候群予防のため、骨髄中の芽球が50%超、又は末梢血中の芽球が15000/μl以上の場合、本剤による治療開始前にデキサメタゾンによる前治療(10mg/m²を最長5日間、静脈内投与)の実施を検討する。 ・各サイクル投与開始前1時間以内および容量増量前1時間以内にデキサメタゾン16.5mgを静脈内投与する。また4時間以上投与を中断した後の再開時も同様の前投与を行う。 ・ルートフラッシュはしない。生食での輸液チューブのプライミングはせず、本剤溶解液でプライミングする。 ・投与後余った溶液は破棄する。(薬剤部に返却) 	<p>day1</p> <table border="1"> <tr> <td>① デキサート</td> <td>16.5 mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩水</td> <td>100 ml</td> </tr> </table> <p>点滴、30分</p> <p>※ビーリンサイトと別ラインで投与する</p> <p>↓</p> <table border="1"> <tr> <td>② ビーリンサイト</td> <td>μg</td> </tr> <tr> <td>(裏フィルター付ルート)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>270 ml</td> </tr> </table> <p>点滴、10ml/h・24時間、残破棄</p>	① デキサート	16.5 mg	生理食塩水	100 ml	② ビーリンサイト	μ g	(裏フィルター付ルート)		生理食塩液	270 ml	<p>day2-28</p> <table border="1"> <tr> <td>① ビーリンサイト</td> <td>μg</td> </tr> <tr> <td>(裏フィルター付ルート)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>270 ml</td> </tr> </table> <p>点滴、10ml/h・24時間、残破棄</p>	① ビーリンサイト	μ g	(裏フィルター付ルート)		生理食塩液	270 ml
	薬品名※()は成分名	投与量	投与日																												
ビーリンサイト (ブリナツモマブ)	28 μ g/body/日	day1-28																													
薬品名※()は成分名	投与量	投与日																													
ビーリンサイト (ブリナツモマブ)	15 μ g/m ² /日	day1-28																													
① デキサート	16.5 mg																														
生理食塩水	100 ml																														
② ビーリンサイト	μ g																														
(裏フィルター付ルート)																															
生理食塩液	270 ml																														
① ビーリンサイト	μ g																														
(裏フィルター付ルート)																															
生理食塩液	270 ml																														
投与スケジュール																															
<table border="1"> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>.....</th> <th>27</th> <th>28</th> <th>.....</th> <th>42(84)</th> </tr> <tr> <td>ビーリンサイト</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>.....</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>.....</td> <td>休業</td> </tr> </table> <p>※投与間隔: 1-5サイクル目42日間 6-9サイクル目84日間</p>	治療日	1	2	3	4	5	27	28	42(84)	ビーリンサイト	●	●	●	●	●	●	●	休業	備考欄								
治療日	1	2	3	4	5	27	28	42(84)																					
ビーリンサイト	●	●	●	●	●	●	●	休業																					