

がん化学療法指示書

登録番号 236

作成日 2019/3/13

レジメン名	XELIRI療法
診療科・対象疾患	(外)進行・再発大腸がん
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	PDになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
ゼローダ	カペシタビン	1600mg/m ²	day1-14
イリノテカン	イリノテカン	200mg/m ²	day1

治療内容	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
							day1						day21	
注射	Rp1		生理食塩液	100mL		ルート確保・フラッシュ用	●							
	Rp2		パロノセトロン(0.75mg)	1袋	15分	点滴静注メイン	●							
			デキサート(6.6mg)	1瓶										
			アトロピン(0.5mg)	1本										
	Rp3		5%大塚糖液	250mL	90分	点滴静注メイン	●							
内服		癌	イリノテカン	200mg/m ² ※										
	ゼローダ(カペシタビン):朝、夕食後30分以内に1日2回内服(day1~day14) day1 夕食後から内服開始													
その他必要薬剤	<ul style="list-style-type: none"> ・アプレピタント(125mg):1cap分1 ルートキープ時に内服(day1) ・アプレピタント(80mg):1cap分1 朝食後に内服(day2,3) ・デカドロン(デキサメタゾン)4mg:2錠分2 朝夕食後に内服(day2~4) 													
総投与時間	1時間45分													
血管外漏出リスク	イリノテカン:炎症性抗がん剤													
投与時の注意事項														
備考欄	<p>【ゼローダ(カペシタビン)投与量(1回量)】 体表面積1.31m²未満・・・900mg 体表面積1.31m²-1.69m²・・・1200mg 体表面積1.69m²-2.07m²・・・1500mg 体表面積2.07m²以上・・・1800mg</p> <p>※イリノテカンは、UGT1A1*6、*28のホモ接合体またはダブルヘテロの場合、150mg/m²で投与する。</p>													