

がん化学療法指示書

登録番号 241

作成日 2019/4/10

レジメン名	5-day MTX療法
診療科・対象疾患	絨毛性疾患
投与間隔	14日ごと
投与サイクル数	血中HCG値が陰性化した後 1～3サイクル

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
注射用メトレキサート	メトレキサート	0.4mg/kg	day1～5

	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
							day1	day2	day3	day4	day5	...	day14	
治療内容	注射	Rp1	癌	注射用メトレキサート	0.4mg/kg		筋注	●	●	●	●	●		
				蒸留水	※									
	内服													
その他必要薬剤														
総投与時間	筋注													
血管外漏出リスク	メトレキサート: 非壊死性抗がん剤													
投与時の注意事項	※メトレキサート50mgを使用し、1バイアルあたり蒸留水2.0mlで溶解し、必要量をシリンジに採取し投与する。													
備考欄	低リスクの絨毛性疾患(進入奇胎、臨床的進入奇胎、奇胎後hCG存続症)に対する第一選択の治療法として5-day メトレキサート療法、あるいは5-day アクチノマイシンD療法のいずれかが行われる。													