

がん化学療法指示書

登録番号 243

作成日 2019/6/12

レジメン名	TC+Bmab療法(卵巣癌)
診療科・対象疾患	卵巣癌
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	6コース

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
パクリタキセル	パクリタキセル	175 mg/m ²	day1
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC=6	day1
ベバシズマブBS	ベバシズマブBS	15 mg/kg	day1

治療内容	投与順序	抗がん剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
							day1	day21	
注射	Rp1		生理食塩液	100ml	任意	ルート確保・フラッシュ用	●							
	Rp2		生理食塩液	100ml	30分	点滴静注メイン	●							
			デキサート注(6.6mg)	2管										
			デキサート注(1.65mg)	2管										
			ファモチジン注(20mg)	1管										
	Rp3		パロノセトロン注(0.75mg)	1袋	15分	点滴静注メイン	●							
	Rp4		生理食塩液	250ml	180分	点滴静注メイン	●							
		癌	パクリタキセル注	175 mg/m ²										
	Rp5		生理食塩液	250ml	60分	点滴静注メイン	●							
		癌	カルボプラチン注	AUC=6										
	Rp6		生理食塩液	100ml	90分※	点滴静注メイン	●							
		癌	ベバシズマブBS	15 mg/kg			総量100mLにする							
内服														
その他必要薬剤	レスタミンコーワ錠(10mg)5錠をルート確保時に内服													
総投与時間	初回:6時間15分、2回目(忍容性良好の場合):5時間45分、3回目以降(忍容性良好の場合):5時間15分													
血管外漏出リスク	パクリタキセル:壊死性抗がん剤 カルボプラチン:炎症性抗がん剤 ベバシズマブBS:非壊死性抗がん剤													
投与時の注意事項	<p>パクリタキセル</p> <ul style="list-style-type: none"> ・溶媒にエタノールを含有しているため、アルコール過敏の有無を確認する ・過敏症予防のためステロイド、H1・H2ブロッカーの前投薬が必要 ・インラインフィルターを用いた専用ルートで投与する <p>※ベバシズマブBSの投与速度は、初回投与の忍容性が良好であれば2回目の投与時間は60分、3回目以降は30分まで短縮できる</p>													
備考欄														