

がん化学療法指示書

登録番号 251

作成日 2020/3/11

レジメン名	TN療法
診療科・対象疾患	卵巣癌
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	6コース

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
パクリタキセル	パクリタキセル	175 mg/m ²	day1
アクブラ	ネダプラチン	80 mg/m ²	day1

	順下	滴剤	抗腫	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
								day1	day21		
治療内容	注射	Rp1		生理食塩液	100ml	任意	ルート確保用	●								
		Rp2		生理食塩液	100ml	30分	点滴静注メイン	●								
				デキサート注(6.6mg)	2管											
				デキサート注(1.65mg)	2管											
				ファモチジン(20mg)	1管											
		Rp2		パロノセトロン(0.75mg)	1袋	15分	点滴静注メイン	●								
		Rp4		生理食塩液	250ml	180分	点滴静注メイン	●								
			癌	パクリタキセル注	175 mg/m ²											
		Rp5		生理食塩液	250ml	60分	点滴静注メイン	●								
			癌	ネダプラチン静注用	80 mg/m ²											
		Rp6		ソルアセトF	500ml	90分	点滴静注メイン	●								
		Rp7		KN3号	500ml	90分	点滴静注メイン	●								
			内服													
		その他必要薬剤	レスタミンコーワ(10mg)5錠をルート確保時に内服													
総投与時間	7時間45分(原則として入院で投与)															
血管外漏出リスク	パクリタキセル:壊死性抗がん剤 アクブラ(ネダプラチン):炎症性抗がん剤															
投与時の注意事項	【パクリタキセル】 ・溶媒にエタノールを含有しているため、アルコール過敏の有無を確認する ・過敏症予防のためステロイド、H1・H2ブロッカーの前投薬が必要 ・インラインフィルターを用いた専用ルートで投与する															
備考欄																