登録番号 252

作成日 2020 年 5 月 13 日 大阪鉄道病院

レジメン名 A+CHP

対象疾患 未治療のCD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫

指示票1枚の内 No.1

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ChemoNavi					治療内容
					day1
薬品名※()は成分名		投与日	投与	8コース	点滴
ドキソルビシン	50mg/ m i	day1	サイクル数		
エンドキサン(シクロホスファミド)	750mg/ m i	day1			
アドセトリス	1.8mg/kg	day1	総投与時間	っ吐甲	
(ブレンツキシマブ ベドチン)		-	ניין נייי ל אנטאו	3時間	① 生食100 mL
プレドニン(プレドニゾロン)	100mg/body	day1-5			ルート確保・フラッシュ用
+D.F2 ()^			血管外漏出リスク	ドキソルビシン: 起壊死性抗がん剤 エンドキサン: 炎症性抗がん剤 アドセトリス: 分類なし	↓ ② かうニセトロン注(3mg/50mL)1袋 全開
投与スケジュール					 ③ ドキソルビシン 0 mg
治療日 1 2 3 4 5 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21	投与時の注意事項	・ドキソルビシンは心機能低下例には禁忌である。蓄積性心毒性の恐れがあり、ドキソルビシンの総投与量は500mg/m以下とする。 ・アドセトリスは蒸留水で溶解 ・infusion reactionがあった場合抗ヒスタミン薬等を前投薬する。	生食 50 mL 30分
			備考欄	・CD30陽性を確認すること・ブレオマイシンとの併用は禁忌	