

# がん化学療法指示書

登録番号 253

作成日 2020/6/10

レジメン名	GEM+Bmab療法
診療科・対象疾患	進行・再発の卵巣癌
投与間隔	4週毎
投与サイクル数	PDになるまで

## Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	Day1、8、15
ベハシズマブBS	ベハシズマブBS	15 mg/kg	Day1

	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
							day1	...	day8	...	day15	...	day28		
治療内容	注射	Rp1	生理食塩液	100ml	任意	ルート確保用	●		●		●				
		Rp2	生理食塩液	100ml	15分	点滴静注メイン	●		●		●				
			デキササート注(6.6mg)	1管											
		Rp3	生理食塩液	100ml	30分	点滴静注メイン	●		●		●				
		癌	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>			総量100mLにする								
		Rp4	生理食塩液	100ml	90分※	点滴静注メイン	●								
		癌	ベハシズマブBS	15 mg/kg			総量100mLにする								
その他必要薬剤															
忍容性	初回:2時間15分、2回目(忍容性良好の場合):1時間45分、3回目(忍容性良好の場合):1時間15分														
血管外漏出リスク	ゲムシタピン:炎症性抗がん剤 ベハシズマブBS:非炎症性抗がん剤														
投与時の注意事項	※ベハシズマブBSの投与速度は、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与速度は60分、3回目以降は30分まで短縮できる														
備考欄	本剤の投与を行う場合には、白金製剤を含む化学療法施行後の症例を対象とし、白金製剤に対する感受性を考慮して本剤以外の治療法を検討した上で投与を開始すること。														