がん化学療法指示書

登録番号　254

作成日　2020/6/10

レジメン名	ペムブロリズマブ療法(維持療法)
診療科・対象疾患	(呼)切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	PDになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1

治療内容

注射

滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール day1								day21
Rp1		生理食塩液	100ml	任意	ルート確保用	●								
Rp2		生理食塩液	100ml	30分	点滴静注メイン	●								
	癌	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200mg											
Rp3		生理食塩液	50ml	15分	フラッシュ用	●								

内服

その他必要薬剤	
総投与時間	45分
血管外漏出リスク	キイトルーダ(ペムブロリズマブ):非壊死性抗がん薬
投与時の注意事項	キイトルーダ(ペムブロリズマブ):フィルター付きルートが必要 Infusion reaction Grade2の場合:本剤の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。
備考欄	【Infusion reaction経験例の前処置処方例】 投与前1.5時間(±0.5時間)に以下薬剤で前処置を行う。 レスタミンコーワ10mg　5錠 アセトアミノフェン300mg　2錠