

がん化学療法指示書

登録番号 257

作成日 2020/9/9

レジメン名	TC療法(子宮体癌)
診療科・対象疾患	(婦)①子宮体癌の術後化学療法 (婦)②進行・再発子宮体癌
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	①6サイクル ②PDになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
パクリタキセル	パクリタキセル	180 mg/m ²	day1
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC=6	day1

	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール						
							day1	day21	
治療内容	注射		Rp1 生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●						
			Rp2 生理食塩液	100mL	30分	点滴静注メイン	●						
			デキサート(6.6mg)	2管									
			デキサート(1.65mg)	2管									
			ファモチジン(20mg)	1管									
			Rp3 パロノセトロン注(0.75mg)	1袋	15分	点滴静注メイン	●						
			Rp4 生理食塩液	250mL	180分	点滴静注メイン	●						
			癌 パクリタキセル注	180 mg/m ²									
			Rp5 生理食塩液	250mL	60分	点滴静注メイン	●						
			癌 カルボプラチン注	AUC=6									
	内服												
その他必要薬剤	レスタミンコーワ錠(10mg)5錠をルート確保時に内服												
総投与時間	4時間45分												
血管外漏出リスク	パクリタキセル:壊死性抗がん剤 カルボプラチン:炎症性抗がん剤												
投与時の注意事項	パクリタキセル ・溶媒にエタノールを含有しているため、アルコール過敏の有無を確認する ・過敏症予防のためステロイド、H1・H2ブロッカーの前投薬が必要 ・インラインフィルターを用いた専用ルートで投与する												
備考欄													