

がん化学療法指示書

登録番号 271

作成日 2021/3/10

レジメン名	weeklyPTX+Bmab(卵巣癌)
診療科・対象疾患	(婦)再発卵巣癌
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	PDになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m ²	Day1、8、15
ベバシズマブBS	ベバシズマブBS	15mg/kg	Day1

	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
							day1	...	day8	...	day15	...	day21	
治療内容			Rp1 生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●		●		●			
			Rp2 生理食塩液	100mL	30分	点滴静注メイン	●		●		●			
			デキサート注(6.6mg)	1管										
			ファモチジン(20mg)	1管										
			Rp3 パロノセトロン(0.75mg)	1袋	15分	点滴静注メイン	●		●		●			
		注射	Rp4 痛 パクリタキセル注	80mg/m ²	60分	点滴静注メイン	●		●		●			
			生理食塩液	250mL										
			Rp5 痛 ベバシズマブBS	15mg/kg	90分※	点滴静注メイン	●							
			生理食塩液	100mL		総量100mLにする								
	内服													
その他必要薬剤	Day1、8、15それぞれにレスタミンコーワ錠(10mg)5錠をルート確保時に内服													
総投与時間	day1(初回):3時間15分 day1(2回目忍容性良好の場合):2時間45分 day1(3回目以降忍容性良好の場合):2時間15分						day8、15:1時間45分							
血管外漏出リスク	パクリタキセル:壊死性抗がん剤 ベバシズマブBS:非壊死性抗がん剤													
投与時の注意事項	パクリタキセル ・溶媒にエタノールを含有しているため、アルコール過敏の有無を確認する ・過敏症予防のためステロイド、H1・H2ブロッカーの前投薬が必要 ・インラインフィルターを用いた専用ルートで投与する ※ベバシズマブBSの投与速度は、初回投与の忍容性が良好であれば2回目の投与時間は60分、3回目以降は30分まで短縮できる													
備考欄														