

がん化学療法指示書

登録番号 274

作成日 2021/3/10

レジメン名	ニボルマブ単独療法 (MSI-High大腸癌)(2週毎)
診療科・対象疾患	(外)MSI-High大腸癌
投与間隔	2週毎
投与サイクル数	PDになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
オブジーボ	ニボルマブ	240mg/body	Day1

治療内容	滴下順	抗がん剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール						
							day1	day14	
注射	Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●						
	Rp2	癌	オブジーボ(ニボルマブ)	240mg	30分	点滴静注メイン	●						
			生理食塩液	100mL									
	Rp3		生理食塩液	50mL	15分	経過観察用・フラッシュ用	●						
内服													
その他必要薬剤													
総投与時間	Day1:50分												
血管外漏出リスク	オブジーボ(ニボルマブ):非壊死性抗がん剤												
投与時の注意事項	オブジーボ(ニボルマブ)はフィルター付きルート要												
備考欄	Infusion Reaction Grade2の場合、オブジーボ(ニボルマブ)の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。 Infusion Reaction経験例では、次回より投与30分前に以下薬剤で前処置を行う。 レスタミンコーワ10mg 5錠 アセトアミノフェン300mg 2錠												