

# がん化学療法指示書

登録番号 275

作成日 2021/3/10

レジメン名	ニボルマブ単独療法 (MSI-High大腸癌)(4週毎)
診療科・対象疾患	(外)MSI-High大腸癌
投与間隔	4週毎
投与サイクル数	PDになるまで

## Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
オブジーボ	ニボルマブ	480mg/body	Day1

治療内容	滴下順	抗がん剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール					
							day1	...	...	...	...	day28
注射	Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●					
	Rp2	癌	オブジーボ(ニボルマブ)	480mg	30分	点滴静注メイン	●					
			生理食塩液	100mL								
	Rp3		生理食塩液	50mL	15分	経過観察・フラッシュ用	●					
内服												
その他必要薬剤												
総投与時間	Day1:50分											
血管外漏出リスク	オブジーボ(ニボルマブ):非壊死性抗がん剤											
投与時の注意事項	オブジーボ(ニボルマブ)はフィルター付きルート要											
備考欄	<p>Infusion Reaction Grade2の場合、オブジーボ(ニボルマブ)の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。</p> <p>Infusion Reaction経験例では、次回より投与30分前に以下薬剤で前処置を行う。                      レスタミンコーワ10mg 5錠                      アセトアミノフェン300mg 2錠</p>											