

ロイナーゼ(L-アスパラギナーゼ)	6000U/ml	day9, 11, 18, 19, 17, 19, 21
-------------------	----------	---------------------------------

レジメン名 SMILE 対象疾患 T細胞リンパ腫 大阪鉄道病院

投与サイクル数	2サイクル	治療内容				
総投与時間	*day9、11、13、15、17、19、21:6時間	day 9 生理食塩液 100mL ルート確保・フラッシュ用 ↓ ロイナーゼ KU 蒸留水 mL 生理食塩液 500mL 10:00-18:00(8h)	day 11 生理食塩液 100mL ルート確保・フラッシュ用 ↓ ロイナーゼ KU 蒸留水 mL 生理食塩液 500mL 10:00-18:00(8h)	day 13 生理食塩液 100mL ルート確保・フラッシュ用 ↓ ロイナーゼ KU 蒸留水 mL 生理食塩液 500mL 10:00-18:00(8h)	day 15 生理食塩液 100mL ルート確保・フラッシュ用 ↓ ロイナーゼ KU 蒸留水 mL 生理食塩液 500mL 10:00-18:00(8h)	day 17 生理食塩液 100mL ルート確保・フラッシュ用 ↓ ロイナーゼ KU 蒸留水 mL 生理食塩液 500mL 10:00-18:00(8h)
血管外漏出リスク	ロイナーゼ:非炎症性抗がん剤					
備考欄	・ロイナーゼ(L-アスハラキナーゼ)投与前に皮内反応試験を行う。 ・10KU/0.1mL皮内注射後30分間観察する。 ・皮内反応試験陽性例ではロイナーゼ(L-アスハラキナーゼ)投与中止。	day 19 生理食塩液 100mL ルート確保・フラッシュ用 ↓ ロイナーゼ KU 蒸留水 mL 生理食塩液 500mL 10:00-18:00(8h)	day 21 生理食塩液 100mL ルート確保・フラッシュ用 ↓ ロイナーゼ KU 蒸留水 mL 生理食塩液 500mL 10:00-18:00(8h)			
		ChemoNavi		レジメン		
		薬品名(原分名) ロイナーゼ(L-アスハラキナーゼ)	投与量 6000U/mf	投与日 day9、11、13、15、17、19、21	SMILE(前半) 治療日 1 2 3 4 5 6 7 プリトシキート(プリトシキート) ● ● ● ● ● ● ● デキサメタゾン(デキサメタゾン) ● ● ● ● ● ● ● エトポシド ● ● ● ● ● ● ● イホマイド(イホマイド) ● ● ● ● ● ● ●	
				SMILE(後半) 治療日 8 9 # 11 12 13 # ロイナーゼ(L-アスハラキナーゼ) ● ● ● ● ● ● ● 治療日 15 # 16 # 18 # 19 # 20 # ロイナーゼ(L-アスハラキナーゼ) ● ● ● ● ● ● ●		