

レジメン名 MEL200療法

対象疾患

多発性骨髄腫

ChemoNavi				治療内容															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アルケラン(メルファラン)</td> <td>100mg/m²</td> <td>day-3, -2</td> </tr> </tbody> </table>		薬品名(成分名)	投与量	投与日	アルケラン(メルファラン)	100mg/m ²	day-3, -2	投与 サイクル数	自家移植が必要なとき	day -3, -2									
薬品名(成分名)	投与量	投与日																	
アルケラン(メルファラン)	100mg/m ²	day-3, -2																	
		総投与時間	day-3, -2:40分																
		血管外漏出 リスク	アルケラン(メルファラン) : 炎症性抗がん剤																
投与スケジュール																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">MEL200療法</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>-3</th> <th>-2</th> <th>-1</th> <th>0※</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アルケラン100mg/m²</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※移植日 (Day0) の3日前 (Day-3)、2日前 (Day-2) にアルケランを投与</p>		MEL200療法					治療日	-3	-2	-1	0※	アルケラン100mg/m ²	●	●			投与時の 注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・アルケランは溶解後安定性が低下するため、調製後1時間30分以内に投与終了する。 ・移植はアルケラン投与終了から24時間以上あけて行う。 	
MEL200療法																			
治療日	-3	-2	-1	0※															
アルケラン100mg/m ²	●	●																	
		備考欄																	

点滴静注

