

がん化学療法指示書

登録番号 293

作成日 2021/9/8

レジメン名	ニボルマブ単独療法(悪性黒色腫) (2週毎)(維持療法)
診療科・対象疾患	(外)悪性黒色腫
投与間隔	2週毎
投与サイクル数	PDになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
オブジーボ	ニボルマブ	240mg/body	Day1

治療内容	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール						
							day1	day14	
注射	Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●						
	Rp2	癌	オブジーボ(ニボルマブ)	240mg	30分	点滴静注メイン	●						
			生理食塩液	100mL									
			総量100mLにする										
	Rp3		生理食塩液	50mL	15分	経過観察用・フラッシュ用	●						
内服													
その他必要薬剤													
総投与時間	Day1: 45分												
血管外漏出リスク	オブジーボ(ニボルマブ): 非壊死性抗がん剤												
投与時の注意事項	オブジーボ(ニボルマブ)はフィルター付きルート要												
備考欄	<p>Infusion Reaction Grade2の場合、オブジーボ(ニボルマブ)の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。</p> <p>Infusion Reaction経験例では、次回より投与30分前に以下薬剤で前処置を行う。 レスタミンコーワ10mg 5錠 アセトアミノフェン300mg 2錠</p> <p>ニボルマブ+イピリムマブ療法を4コース実施後、ニボルマブ単剤療法(2週毎or4週毎)の維持療法を行う。</p>												