がん化学療法指示書

登録番号　294
登録日　2024/8/7

レジメン名	ニボルマブ単剤療法(4週毎)
診療科・対象疾患	(外)悪性黒色腫の維持療法 (呼)切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん
投与間隔	4週毎
投与サイクル数	PDになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
オプジーボ	ニボルマブ	480mg/body	day1

		滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール						
								day1	…	…	…	…	…	day28
治療内容	注射	Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保用	●						
		Rp2		生理食塩液	100mL	30分	点滴静注メイン	●						
			癌	オプジーボ(ニボルマブ)	480mg									
				総量100mLにする										
		Rp3		生理食塩液	50mL	15分	フラッシュ用	●						
	内服													

その他必要薬剤	
総投与時間	45分
血管外漏出リスク	オプジーボ(ニボルマブ):非壊死性抗がん薬
投与時の注意事項	オプジーボ(ニボルマブ):フィルター付きルートが必要 シリコーン製のCVポートは蛋白質の凝集を認めるため、使用を避ける。
備考欄	Infusion reaction　Grade2の場合、オプジーボ(ニボルマブ)の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。 【Infusion reaction経験例の前処置処方例】 レスタミンコーワ10mg　5錠 アセトアミノフェン300mg　2錠 ＜悪性黒色腫＞ニボルマブ＋イピリムマブ療法を4コース実施後、ニボルマブ単剤療法(2週毎or4週毎)の維持療法を行う。