

レジメン名 RVD lite療法 (75歳以上)(1-9サイクル目)

対象疾患 多発性骨髄腫

ChemoNavi			投与 サイクル数	9サイクル	治療内容																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>1.3mg/m²</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> <tr> <td>レブラミド(レナリドミド)</td> <td>15mg/body</td> <td>day1-21</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>20mg/body</td> <td>day1,8,15,22</td> </tr> </tbody> </table>					薬品名(成分名)	投与量	投与日	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22	レブラミド(レナリドミド)	15mg/body	day1-21	レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,8,15,22	総投与時間	皮下注射・内服	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> レナデックス 錠 分1朝 </div>																																																																		
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																			
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22																																																																																			
レブラミド(レナリドミド)	15mg/body	day1-21																																																																																			
レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,8,15,22																																																																																			
投与スケジュール			血管外漏出 リスク	ボルテゾミブ: 炎症性抗がん剤	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ボルテゾミブ _____ mg 生理食塩液 _____ ml 腹部に皮下注 </div>																																																																																
<div style="background-color: yellow; padding: 2px;">RVD lite療法 1-9サイクル目(75歳以上)</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レブラミド</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			治療日	1	2	8	9	15	16	21	22	35	ボルテゾミブ	●				●				●					●						レブラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							レナデックス	●				●				●					●						投与時の 注意事項	・ボルテゾミブは腹部に皮下注射する。 ・ボルテゾミブの投与部位は前回と同じ位置への投与を避ける。 ・ボルテゾミブは溶解後8時間以内に使用すること。	day1-21
治療日	1	2	8	9	15	16	21	22	35																																																																		
ボルテゾミブ	●				●				●					●																																																																							
レブラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																								
レナデックス	●				●				●					●																																																																							
1サイクル35日			備考欄	・10-15サイクル目はVR療法 ・16コース目以降はL維持療法あるいは終了	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> レブラミド 錠 分1朝 </div>																																																																																

レジメン名 RVD lite療法 (75歳未満)(1-9サイクル目) 対象疾患 多発性骨髄腫

ChemoNavi			投与 サイクル数	9サイクル	治療内容																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>1.3mg/m²</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> <tr> <td>レブラミド(レナリドミド)</td> <td>15mg/body</td> <td>day1-21</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)</td> <td>20mg/body</td> <td>day1,2,8,9,15,16,22,23</td> </tr> </tbody> </table>					薬品名(成分名)	投与量	投与日	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22	レブラミド(レナリドミド)	15mg/body	day1-21	レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	総投与時間	皮下注射・内服	day1、8、15、22 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> レナデックス 錠 分1朝 </div>																																																																		
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																			
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 8, 15, 22																																																																																			
レブラミド(レナリドミド)	15mg/body	day1-21																																																																																			
レナデックス(デキサメタゾン)	20mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23																																																																																			
投与スケジュール			血管外漏出 リスク	ボルテゾミブ: 炎症性抗がん剤	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> ボルテゾミブ _____ mg 生理食塩液 _____ ml 腹部に皮下注 </div>																																																																																
<div style="background-color: yellow; padding: 2px;">RVD lite療法 1-9サイクル目(75歳未満)</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レブラミド</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			治療日	1	2	8	9	15	16	21	22	23	35	ボルテゾミブ	●				●				●					●						レブラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							レナデックス	●	●			●	●			●	●				●	●					投与時の 注意事項	・ボルテゾミブは腹部に皮下注射する。 ・ボルテゾミブの投与部位は前回と同じ位置への投与を避ける。 ・ボルテゾミブは溶解後8時間以内に使用すること。	day2、9、16、23 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> レナデックス 錠 分1朝 </div>
治療日	1	2	8	9	15	16	21	22	23	35																																																																		
ボルテゾミブ	●				●				●					●																																																																							
レブラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																								
レナデックス	●	●			●	●			●	●				●	●																																																																						
1サイクル35日			備考欄	・10-15サイクル目はVR療法 ・16コース目以降はL維持療法あるいは終了	day1-21 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> レブラミド 錠 分1朝 </div>																																																																																

レジメン名 RVD lite療法(10-15サイクル目) 対象疾患 多発性骨髄腫

ChemoNavi			投与 サイクル数	6サイクル	治療内容																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>1.3mg/m²</td> <td>day1, 15</td> </tr> <tr> <td>レプラミド(レナリドミド)</td> <td>15mg/body</td> <td>day1-21</td> </tr> </tbody> </table>					薬品名(成分名)	投与量	投与日	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 15	レプラミド(レナリドミド)	15mg/body	day1-21	総投与時間	皮下注射・内服	<table border="1"> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>_____ mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>_____ ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">腹部に皮下注</td> </tr> </table>	ボルテゾミブ	_____ mg	生理食塩液	_____ ml	腹部に皮下注																																																				
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																							
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	day1, 15																																																																							
レプラミド(レナリドミド)	15mg/body	day1-21																																																																							
ボルテゾミブ	_____ mg																																																																								
生理食塩液	_____ ml																																																																								
腹部に皮下注																																																																									
投与スケジュール			血管外漏出 リスク	ボルテゾミブ: 炎症性抗がん剤																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="14">RVD lite療法 10-15サイクル目</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>8</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>15</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>21</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボルテゾミブ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レプラミド</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			RVD lite療法 10-15サイクル目														治療日	1	8	15	21	28	ボルテゾミブ	●								●									レプラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				投与時の 注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ボルテゾミブは腹部に皮下注射する。 ・ボルテゾミブの投与部位は前回と同じ位置への投与を避ける。 ・ボルテゾミブは溶解後8時間以内に使用すること。 	day1-21
RVD lite療法 10-15サイクル目																																																																									
治療日	1	8	15	21	28																																																								
ボルテゾミブ	●								●																																																																
レプラミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																											
1サイクル28日			備考欄	<ul style="list-style-type: none"> ・10-15サイクル目はVR療法 ・16コース目以降はL維持療法あるいは終了 	<table border="1"> <tr> <td>レプラミド</td> <td>錠</td> </tr> <tr> <td colspan="2">分1朝</td> </tr> </table>	レプラミド	錠	分1朝																																																																	
レプラミド	錠																																																																								
分1朝																																																																									