

ChemoNavi			治療内容																																																																											
			day1	day2	day3	day4																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>メトレキセート(メトレキセート)</td> <td>1500mg/m²</td> <td>day1, 15</td> </tr> <tr> <td>オンコピン(ピンクリスチン)</td> <td>1.3mg/m²</td> <td>day1, 15</td> </tr> <tr> <td>ロイケリン(メルカプトリン) 内服</td> <td>25mg/m²</td> <td>day1~21</td> </tr> </tbody> </table>	薬品名(成分名)	投与量	投与日	メトレキセート(メトレキセート)	1500mg/m ²	day1, 15	オンコピン(ピンクリスチン)	1.3mg/m ²	day1, 15	ロイケリン(メルカプトリン) 内服	25mg/m ²	day1~21	<p>投与サイクル数 2サイクル</p> <p>総投与時間 day1.15 18時間 day2.3.4.16.17.18 24時間</p> <p>血管外漏出リスク メトレキセート(メトレキセート):非壊死抗がん剤 オンコピン(ピンクリスチン):壊死性抗がん剤</p>	<p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">JALSG-ALL202-O地固め療法C2, C5(50歳以上)</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>...</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>...</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>...</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>メトレキセート</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オンコピン</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ロイケリン</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>投与時の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> メトレキセート投与終了12時間後にレボホリナートを25mg投与、以後6時間ごとにレボホリナート7.5mgを7回投与する。 レボホリナートの前後生理食塩液でフラッシュする。 <p>備考欄</p> <ul style="list-style-type: none"> day1.15に髄腔内注射(メトレキセート、デキサメタゾン)投与を考慮する。 ロイケリン内服中は尿酸降下薬投与は禁忌(ロイケリンの血中濃度が上昇するため) メトレキセート投与終了24時間後、48時間後にメトレキセート血中濃度測定する。 尿のアルカリ化の確認 day1.day15(22:00) day2.day16(10:00,22:00) 尿pH7以上であること確認する。 尿pH7未満ならメイロン(20)1A追加 	JALSG-ALL202-O地固め療法C2, C5(50歳以上)										治療日	1	2	...	15	16	...	21	22	...	28	メトレキセート	●			●							オンコピン											ロイケリン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<p>① KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 8:00~12:00</p> <p>② 生理食塩液 100ml 10:00~ ルート確保・フラッシュ用別ルート</p> <p>③ グラニセトロン注(3mg/50μl)1袋 10:10~ 全開 別ルート</p> <p>④ オンコピン mg 生理食塩液 50ml 10:20~ 全開 別ルート</p> <p>⑤ メトレキセート mg 5%ブドウ糖液 400ml 10:30~翌10:30 24時間 別ルート</p> <p>⑥ ソリタT1 500ml メイロン 40ml メイン 12:00~18:00</p> <p>⑦ KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 18:00~24:00</p>	<p>① KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 0:00~12:00</p> <p>② KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 12:00~24:00</p> <p>レボホリナート 25mg ③ 5%ブドウ糖液 20mL 側 22:30~ 全開</p>	<p>① KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 0:00~12:00</p> <p>② KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 12:00~24:00</p> <p>レボホリナート 7.5mg ⑤ 5%ブドウ糖液 6mL 側 16:30~ 全開</p> <p>レボホリナート 7.5mg ⑥ 5%ブドウ糖液 6mL 側 22:30~ 全開</p>	<p>① KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 0:00~12:00</p> <p>② KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 12:00~24:00</p> <p>レボホリナート 7.5mg ⑤ 5%ブドウ糖液 6mL 側 16:30~ 全開</p> <p>レボホリナート 7.5mg ⑤ 5%ブドウ糖液 6mL 側 16:30~ 全開</p>	<p>尿pH7以上確認 22:00</p> <p>尿pH7以上確認 10:00 22:00</p> <p>10:30 採血 MTX終了24時間後濃度確認</p> <p>10:30 採血 MTX終了48時間後濃度確認</p>	<p>内服</p> <p>1~21日目</p> <table border="1"> <tr> <td>ロイケリン</td> <td>g</td> </tr> <tr> <td>分1 睡前</td> <td></td> </tr> </table>	ロイケリン	g	分1 睡前	
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																												
メトレキセート(メトレキセート)	1500mg/m ²	day1, 15																																																																												
オンコピン(ピンクリスチン)	1.3mg/m ²	day1, 15																																																																												
ロイケリン(メルカプトリン) 内服	25mg/m ²	day1~21																																																																												
JALSG-ALL202-O地固め療法C2, C5(50歳以上)																																																																														
治療日	1	2	...	15	16	...	21	22	...	28																																																																				
メトレキセート	●			●																																																																										
オンコピン																																																																														
ロイケリン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																				
ロイケリン	g																																																																													
分1 睡前																																																																														

ChemoNavi			治療内容																																																																																
			day15	day16	day17	day18																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>メトトレキサート(メトトレキサート)</td> <td>1500mg/m²</td> <td>day1, 15</td> </tr> <tr> <td>オンコピン(ピンクリステン)</td> <td>1.3mg/m²</td> <td>day1, 15</td> </tr> <tr> <td>ロイケリン(メルカプトプリン) 内服</td> <td>25mg/m²</td> <td>day1~21</td> </tr> </tbody> </table>	薬品名(成分名)	投与量	投与日	メトトレキサート(メトトレキサート)	1500mg/m ²	day1, 15	オンコピン(ピンクリステン)	1.3mg/m ²	day1, 15	ロイケリン(メルカプトプリン) 内服	25mg/m ²	day1~21	<p>投与サイクル数 2サイクル</p> <p>総投与時間 day1.15 18時間 day2.3.4.16.17.18 24時間</p> <p>血管外漏出リスク メトトレキサート(メトトレキサート) :非壊死 抗がん剤 オンコピン(ピンクリステン) :壊死性 抗がん剤</p>	<p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">JALSG-ALL202-O地固め療法C2, C5(50歳以上)</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>..</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>..</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>..</th> <th>28</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>メトトレキサート</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オンコピン</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ロイケリン</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>投与時の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> メトトレキサート投与終了12時間後にレボホリナートを25mg投与、以後6時間ごとにレボホリナート7.5mgを7回投与する。 レボホリナートの前後生理食塩液でフラッシュする。 <p>備考欄</p> <ul style="list-style-type: none"> day1.15に髄腔内注射(メトトレキサート、デキサザン)投与を考慮する。 ロイケリン内服中は尿酸降下薬投与は禁忌(ロイケリンの血中濃度が上昇するため) メトトレキサート投与終了24時間後、48時間後にメトトレキサート血中濃度測定する。 尿のアルカリ化の確認 day1.day15(22:00) day2.day16(10:00,22:00) 尿pH7以上であること確認する。 尿pH7未満ならメイロン(20)1A追加 	JALSG-ALL202-O地固め療法C2, C5(50歳以上)													治療日	1	2	..	15	16	..	21	22	..	28			メトトレキサート	●			●									オンコピン	●			●									ロイケリン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<p>① KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 6:00~12:00</p> <p>② 生理食塩液 100ml 10:00~ ルート確保・フラッシュ用 別ルート</p> <p>③ グラニセロン注(3mg/50μl)1袋 10:10~ 全開 別ルート</p> <p>④ オンコピン mg 生理食塩液 50ml 10:20~ 全開 別ルート</p> <p>⑤ メトトレキサート mg 5%ブドウ糖液 400ml 10:30~至10:30 24時間 別ルート</p> <p>⑥ ソリタT1 500ml メイロン 40ml メイン 12:00~18:00</p> <p>⑦ KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 18:00~24:00</p> <p>尿pH7以上確認 22:00</p>	<p>① KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 0:00~12:00</p> <p>② KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 12:00~24:00</p> <p>③ レボホリナート 25mg 5%ブドウ糖液 20mL 側 22:30~ 全開</p> <p>尿pH7以上確認 10:00 22:00</p>	<p>① KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 0:00~12:00</p> <p>② レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 側 4:30~ 全開</p> <p>③ レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 側 10:30~ 全開</p> <p>④ KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 12:00~24:00</p> <p>⑤ レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 側 16:30~ 全開</p> <p>⑥ レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 側 22:30~ 全開</p> <p>10:30 採血 MTX終了24時間後濃度 確認</p>	<p>① KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 0:00~12:00</p> <p>② レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 側 4:30~ 全開</p> <p>③ 5%ブドウ糖液 6mL 側 10:30~ 全開</p> <p>④ KN3号液 500ml メイロン 40ml メイン 12:00~24:00</p> <p>⑤ レボホリナート 7.5mg 5%ブドウ糖液 6mL 側 16:30~ 全開</p> <p>10:30 採血 MTX終了48時間後濃度 確認</p>
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																	
メトトレキサート(メトトレキサート)	1500mg/m ²	day1, 15																																																																																	
オンコピン(ピンクリステン)	1.3mg/m ²	day1, 15																																																																																	
ロイケリン(メルカプトプリン) 内服	25mg/m ²	day1~21																																																																																	
JALSG-ALL202-O地固め療法C2, C5(50歳以上)																																																																																			
治療日	1	2	..	15	16	..	21	22	..	28																																																																									
メトトレキサート	●			●																																																																															
オンコピン	●			●																																																																															
ロイケリン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																							
			<p>内服</p> <p>1~21日目</p> <table border="1"> <tr> <td>ロイケリン</td> <td>g</td> </tr> <tr> <td>分1 眠前</td> <td></td> </tr> </table>				ロイケリン	g	分1 眠前																																																																										
ロイケリン	g																																																																																		
分1 眠前																																																																																			