

レジメン名 JALSG-ALL202-O維持療法

対象疾患 急性リンパ性白血病

| ChemoNavi | | | | | 治療内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|------|------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------|---|---|---|----|----|-------|-------|---------------------|----|-------|---|-------------------|----|-----------|--|---|--|-------|----|-------|------|-----------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---------|--|---------------|--|----|---------|----|------------|-------|--|-------|--|----|---------|-------|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オンコピン(ビンクリスチン)</td> <td>1.3mg/m²</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>プレドニン(プレドニゾロン)内服</td> <td>60mg/m²</td> <td>day1~5</td> </tr> <tr> <td>メトトレキサート(メトトレキサート)内服※</td> <td>20mg/m²</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> <tr> <td>ロイケリン(6-メルカプトプリン)内服※</td> <td>60mg/m²</td> <td>day1~28(連日)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※メトトレキサート、ロイケリンの量や投与日数は白血球数が2500~3500になるように調整。 白血球数1500以下、好中球数750以下、血小板数5万以下、GPT正常上限の3倍以上で中止。 回復すれば前回投与量の50%で再開。可能であれば規定量まで漸増。</p> | 薬品名(成分名) | 投与量 | 投与日 | オンコピン(ビンクリスチン) | 1.3mg/m ² | day1 | プレドニン(プレドニゾロン)内服 | 60mg/m ² | day1~5 | メトトレキサート(メトトレキサート)内服※ | 20mg/m ² | day1, 8, 15, 22 | ロイケリン(6-メルカプトプリン)内服※ | 60mg/m ² | day1~28(連日) | <p>投与サイクル数</p> <p>寛解導入開始から24ヶ月経過するまで</p> <p>総投与時間</p> <p>30分</p> <p>血管外漏出リスク</p> <p>オンコピン(ビンクリスチン) :壊死性抗がん剤</p> | <p>day 1</p> <table border="1"> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>100mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10:00~ ルート確保・フラッシュ用</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td>グラニセトン注(3mg/50mL)</td> <td>1袋</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10:10~ 全開</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td>オンコピン</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>50mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10:20~ 全開</td> </tr> </table> | | | | 生理食塩液 | 100mL | 10:00~ ルート確保・フラッシュ用 | | ↓ | | グラニセトン注(3mg/50mL) | 1袋 | 10:10~ 全開 | | ↓ | | オンコピン | mg | 生理食塩液 | 50mL | 10:20~ 全開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬品名(成分名) | 投与量 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンコピン(ビンクリスチン) | 1.3mg/m ² | day1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレドニン(プレドニゾロン)内服 | 60mg/m ² | day1~5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メトトレキサート(メトトレキサート)内服※ | 20mg/m ² | day1, 8, 15, 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロイケリン(6-メルカプトプリン)内服※ | 60mg/m ² | day1~28(連日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:00~ ルート確保・フラッシュ用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グラニセトン注(3mg/50mL) | 1袋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:10~ 全開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンコピン | mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:20~ 全開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与スケジュール | | | 投与時の注意事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">JALSG-ALL202-O維持療法</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>..</th> <th>5</th> <th>..</th> <th>8</th> <th>..</th> <th>15</th> <th>..</th> <th>22</th> <th>..</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オンコピン</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレドニン(内服)</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>メトトレキサート(内服)</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ロイケリン(内服)</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> | | | JALSG-ALL202-O維持療法 | | | | | | | | | | 治療日 | 1 | .. | 5 | .. | 8 | .. | 15 | .. | 22 | .. | 28 | オンコピン | ● | | | | | | | | | | | プレドニン(内服) | ● | ● | ● | | | | | | | | | メトトレキサート(内服) | ● | | | | ● | | ● | | ● | | | ロイケリン(内服) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | <p>備考欄</p> <p>・オンコピンは2mg/bodyを超えない。イレウスがみられる場合は中止、Grade3以上の末梢神経障害が診られる場合は減量または中止する。</p> <p>・ロイケリン内服中は尿酸降下薬投与は禁忌(ロイケリンの血中濃度が上昇するため)。</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">day 1~5</th> <th colspan="2">day 1,8,15,22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内服</td> <td>プレドニン 錠</td> <td>内服</td> <td>メトトレキサート 錠</td> </tr> <tr> <td colspan="2">分2 朝昼</td> <td colspan="2">分1 眠前</td> </tr> </tbody> </table> <p>day1~28</p> <table border="1"> <tr> <td>内服</td> <td>ロイケリン g</td> </tr> <tr> <td colspan="2">分1 眠前</td> </tr> </table> | day 1~5 | | day 1,8,15,22 | | 内服 | プレドニン 錠 | 内服 | メトトレキサート 錠 | 分2 朝昼 | | 分1 眠前 | | 内服 | ロイケリン g | 分1 眠前 | |
| JALSG-ALL202-O維持療法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 治療日 | 1 | .. | 5 | .. | 8 | .. | 15 | .. | 22 | .. | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンコピン | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレドニン(内服) | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メトトレキサート(内服) | ● | | | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロイケリン(内服) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| day 1~5 | | day 1,8,15,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | プレドニン 錠 | 内服 | メトトレキサート 錠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分2 朝昼 | | 分1 眠前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | ロイケリン g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分1 眠前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |