

がん化学療法指示書

登録番号 309

作成日 2021/12/8

レジメン名	TC療法(子宮頸癌)
診療科・対象疾患	(婦)再発・進行子宮頸癌
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	2~6サイクル

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m ²	day1
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC=5	day1

治療内容	投与スケジュール	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール						
								day1	day21	
注射	Rp1			生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●						
	Rp2			生理食塩液	100mL	30分	点滴静注メイン	●						
				デキサート(6.6mg)	1管									
				ファモチジン(20mg)	1管									
	Rp3			パロノセトロン注(0.75mg)	1袋	15分	点滴静注メイン	●						
	Rp4			生理食塩液	250mL	180分	点滴静注メイン	●						
				癌	パクリタキセル注	175 mg/m ²								
	Rp5			生理食塩液	250mL	60分	点滴静注メイン	●						
				癌	カルボプラチン注	AUC=5								
その他必要薬剤	day1点滴開始時にレスタミンコーワ錠(10mg)5錠 内服 day1点滴開始時アプレピタント(125mg)1カプセル 内服 day2.3にアプレピタント(80mg)1カプセル分1朝食後 内服													
総投与時間	5時間													
血管外漏出リスク	パクリタキセル:壊死性抗がん剤 カルボプラチン:炎症性抗がん剤													
投与時の注意事項	パクリタキセル ・溶媒にエタノールを含有しているため、アルコール過敏の有無を確認する ・過敏症予防のためデキサメタゾン、ジフェンヒドラミン・ファモチジンの前投薬が必要 ・インラインフィルターを用いた専用ルートで投与する													
備考欄														