

がん化学療法指示書

登録番号 310

作成日 2021/12/8

レジメン名	XELOX+Pmab療法
診療科・対象疾患	(外)KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸癌
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	PDになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
ベクティビックス	パニツムマブ	6mg/kg	Day1
オキサリプラチン	オキサリプラチン	130mg/m ²	Day1
カペシタビン	カペシタビン	内服参照	Day1~14

治療内容	投与スケジュール	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
								day1	day21		
注射	Rp1			生理食塩液	100mL	任意	メインルート確保・フラッシュ用	●								
	Rp2			パロノセトロン(3mg/50mL)	1袋	15分	点滴静注メイン	●								
				デキサート(6.6mg)	1瓶											
				ボラミン(5mg)	1A											
	Rp3	癌		ベクティビックス(パニツムマブ)	6mg/kg	60分	点滴静注メイン	●								
				生理食塩液	100mL											
				総量100mLにする												
	Rp4			生理食塩液	50mL	全開	フラッシュ用	●								
	Rp5	癌		オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	点滴静注メイン	●								
				5%ブドウ糖	250mL											
				デキサート(1.65mg)	1A											
内服	カペシタビン:朝・夕食後30分以内に1日2回内服(Day1は夕食後から内服開始) 1.36m ² 未満:1200mg/回 1.36m ² 以上~1.66m ² 未満:1500mg/回 1.66m ² 以上~1.96m ² 未満:1800mg/回 1.96m ² 以上:2100mg/回															
その他必要薬剤																
総投与時間	3時間30分															
血管外漏出リスク	ベクティビックス(パニツムマブ):非壊死性抗がん剤 オキサリプラチン:炎症性抗がん剤															
投与時の注意事項	ベクティビックス(パニツムマブ) ・インラインフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を用いて投与する。 ・60分以上かけて点滴静注する(但し、1回投与量として1000mgを超える場合は、90分以上かけて点滴静注する)															
備考欄																