

がん化学療法指示書

登録番号 315

作成日 2022/1/12

レジメン名	ニボルマブ+SOX療法
診療科・対象疾患	(外)HER2陰性 治癒切除不能な進行・再発胃癌/食道胃接合部癌
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	PDになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
オブジーボ	ニボルマブ	360mg/body	day1
オキサリプラチン	オキサリプラチン	130mg/m ²	day1
エスワン	テガフル、ギメラシル、オテラシルカリウム	備考欄参照	day1-14

	滴下順	抗がん剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
							day1						day21	
治療内容	注射		Rp1 生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●							
			Rp2 生理食塩液	100mL	30分	点滴静注メイン	●							
			癌 オブジーボ	360mg/body										
				総量を100mLにする										
				Rp3 生理食塩液	50mL	15分	経過観察・フラッシュ用	●						
				Rp4 パロノセトロン(0.75mg)	1袋	15分	点滴静注メイン	●						
				デキサート(6.6mg)	1瓶									
				Rp5 5%大塚糖液	250mL	120分	点滴静注メイン	●						
				デキサート(1.65mg)	1管									
				癌 オキサリプラチン	130mg/m ²									
	内服	エスワン(S-1):朝、夕食後に1日2回内服(day1~day14)												
その他必要薬剤														
総投与時間	3時間10分													
血管外漏出リスク	オブジーボ:非壊死性抗がん剤 オキサリプラチン:炎症性抗がん剤													
投与時の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> オブジーボ(ニボルマブ)はフィルター付きルート要 シリコーン製のCVポートは蛋白質の凝集を認めるため、使用を避ける。 													
備考欄	<p>【S-1(エスワン)投与量(1回量)】 体表面積1.25m²未満・・・40mg 体表面積1.25m²-1.50m²・・・50mg 体表面積1.50m²以上・・・60mg</p> <p>Infusion Reaction Grade2の場合、オブジーボ(ニボルマブ)の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。</p> <p>Infusion Reaction経験例では、次回より投与30分前に以下薬剤で前処置を行う。 レスタミンコーワ10mg 5錠 アセトアミノフェン300mg 2錠</p>													