

がん化学療法指示書

登録番号

320

作成日

2022/2/9

レジメン名	weekly PTX+ペムプロリズマブ療法(3週毎)
診療科・対象疾患	(外)PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳がん
投与間隔	12週毎
投与サイクル数	PDIになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg/body	Day1、22、43、64
パクリタキセル	パクリタキセル	90mg/m ²	Day1、8、15、29、36、43、57、64、71

治療内容	注射	滴下順	抗がん剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール																
								day1	day8	day15	day22	day29	day36	day43	day50	day57	day64	day71	day78	day84				
								●																
		Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●							●			●						
		Rp2		生理食塩液	100mL	15分	点滴静注メイン	●							●			●						
				デキサート注(6.6mg)	1瓶																			
				ファモチジン注(20mg)	1瓶																			
		Rp3	癌	キイトルーダ(ペムプロリズマブ)	200mg	30分	点滴静注メイン	●							●			●						
				生理食塩液	100mL																			
		Rp4		生理食塩液	50mL	15分	点滴静注メイン 経過観察用	●							●			●						
		Rp5	癌	パクリタキセル	90mg/m ²	60分	点滴静注メイン	●							●			●						
				生理食塩液	250mL																			
		順下	抗がん剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール																
		Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用		●	●		●	●				●			●				
		Rp2		生理食塩液	100mL	15分	点滴静注メイン		●	●		●	●				●			●				
				デキサート注(6.6mg)	1瓶																			
				ファモチジン注(20mg)	1瓶																			
		Rp3		生理食塩液	100mL	30分	点滴静注メイン 経過観察用		●	●		●	●				●			●				
		Rp4	癌	パクリタキセル	90mg/m ²	60分	点滴静注メイン		●	●		●	●				●			●				
				生理食塩液	250mL																			
		滴下順	抗がん剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール																
		Rp1		生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用							●										
		Rp2	癌	キイトルーダ(ペムプロリズマブ)	200mg	30分	点滴静注メイン							●										
				生理食塩液	100mL																			
		Rp3		生理食塩液	50mL	15分	フラッシュ用							●										
その他必要薬剤	Day1、8、15、29、36、43、57、64、71それぞれにレスタミンコーワ錠(10mg)5錠をルート確保時に内服																							
総投与時間	day1、43、64:2時間10分 day8、15、29、36、57、71:1時間55分 day22:55分																							
血管外漏出リスク	パクリタキセル:壊死性抗がん剤 キイトルーダ(ペムプロリズマブ):非壊死性抗がん剤																							
投与時の注意事項	パクリタキセルはアルコール過敏の有無を確認する キイトルーダ(ペムプロリズマブ)、パクリタキセルはフィルター付きルート要																							
備考欄	Infusion Reaction Grade2の場合、キイトルーダ(ペムプロリズマブ)の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。 Infusion Reaction経験例では、次回より投与30分前に以下薬剤で前処置を行う。 レスタミンコーワ10mg 5錠 アセトアミノフェン300mg 2錠																							