

レジメン名 GCD療法 対象疾患 再発又は難治性の悪性リンパ腫(非ホジキンリンパ腫、ホジキンリンパ腫)

ChemoNavi			治療内容																																																																																														
GCD療法 <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ゲムシタピン(ゲムシタピン)</td> <td>1000mg/m²</td> <td>day1, 8</td> </tr> <tr> <td>カルボプラチン(カルボプラチン)</td> <td>AUC=5</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>デキサート(デキサメタゾン)</td> <td>39.6mg/body</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>デカドロン錠(デキサメタゾン)内服</td> <td>40mg/body</td> <td>day2-4</td> </tr> </tbody> </table> <p>血小板数5-10万/μl、好中球数500-1000/μlなら、Day8のゲムシタピンを減量。 血小板数5万/μl、好中球数500/μlなら、Day8のゲムシタピンは投与なし。</p>			薬品名(成分名)	投与量	投与日	ゲムシタピン(ゲムシタピン)	1000mg/m ²	day1, 8	カルボプラチン(カルボプラチン)	AUC=5	day1	デキサート(デキサメタゾン)	39.6mg/body	day1	デカドロン錠(デキサメタゾン)内服	40mg/body	day2-4	投与サイクル数 PDまで	day1 ① アブレピタント125mg 1カプセル 内服 点滴開始時 ↓ ② 生理食塩液 100ml ルート確保・フラッシュ用 ↓ ③ グラニセトロン 50ml デキサート 39.6mg 点滴 15分 ↓ ④ 生理食塩液 100ml ゲムシタピン m g 点滴 30分 総量100mLにする ↓ ⑤ 生理食塩液 250ml カルボプラチン m g 点滴 1時間	day8 ① 生理食塩液 100ml ルート確保・フラッシュ用 ↓ ② 生理食塩液 100ml デキサート 6.6mg 点滴 15分 ↓ ③ 生理食塩液 100ml ゲムシタピン m g 点滴 30分 総量100mLにする																																																																													
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																															
ゲムシタピン(ゲムシタピン)	1000mg/m ²	day1, 8																																																																																															
カルボプラチン(カルボプラチン)	AUC=5	day1																																																																																															
デキサート(デキサメタゾン)	39.6mg/body	day1																																																																																															
デカドロン錠(デキサメタゾン)内服	40mg/body	day2-4																																																																																															
投与スケジュール <table border="1"> <thead> <tr> <th>GCD療法</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>...</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ゲムシタピン</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>カルボプラチン</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>デキサート</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>デカドロン</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 1サイクル21日			GCD療法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	ゲムシタピン	●							●										カルボプラチン	●																	デキサート	●																	デカドロン		●	●	●														総投与時間 day1 1時間55分 day8 55分	血管外漏出リスク ゲムシタピン 炎症性抗がん剤 カルボプラチン 炎症性抗がん剤	その他の薬剤 アブレピタント125mg 1カプセル 点滴開始時(day1) アブレピタント80mg 1カプセル(day2-3) 分1 朝食後(day2-3)	day2-3 アブレピタント80mg 1カプセル 内服 分1 朝食後	day2-4 デカドロン4mg 10錠 内服 分2 朝食後
GCD療法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21																																																																																
ゲムシタピン	●							●																																																																																									
カルボプラチン	●																																																																																																
デキサート	●																																																																																																
デカドロン		●	●	●																																																																																													
			投与時の注意事項	備考欄																																																																																													