

レジメン名 GDP療法 対象疾患 再発又は難治性の悪性リンパ腫(非ホジキンリンパ腫、ホジキンリンパ腫)

ChemoNavi		治療内容																																																																									
GDP療法 <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ゲムシタピン(ゲムシタピン)</td> <td>1000mg/m²</td> <td>day1, 8</td> </tr> <tr> <td>シスプラチン(シスプラチン)</td> <td>75mg/m²</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>デキササート(デキサメタゾン)</td> <td>39.6mg/body</td> <td>day1-4</td> </tr> </tbody> </table> <p>・血小板数5-10万/μl、好中球数500-1000/μlなら、Day8のゲムシタピンを減量。 血小板数5万/μl、好中球数500/μlなら、Day8のゲムシタピンは投与なし。</p>	薬品名(成分名)	投与量	投与日	ゲムシタピン(ゲムシタピン)	1000mg/m ²	day1, 8	シスプラチン(シスプラチン)	75mg/m ²	day1	デキササート(デキサメタゾン)	39.6mg/body	day1-4	投与サイクル数 6コースまで	day1 ① アブレピタント125mg 1カプセル 内服 点滴開始時 ↓ ② 生理食塩液 100ml メイン ルート確保・フラッシュ用 ↓ ③ パロノセトロン 50ml デキサート 39.6mg メイン 点滴 15分 ↓ ④ 生理食塩液 100ml ゲムシタピン m g メイン 点滴 30分 総量100mLにする ↓ ⑤ 生理食塩液 250ml メイン 点滴 30分 ↓ ⑥ 生理食塩液 500ml シスプラチン m g メイン 点滴 2時間 総量500mLにする ↓ ⑦ 生理食塩液 500ml メイン 点滴 2時間 ↓ ⑧ マンニトールS 300ml 側管 生理食塩液500mL 投与1時間後開始 点滴 1時間	day2-4 生理食塩液 100ml デキサート 39.6mg 点滴 15分																																																												
	薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																								
ゲムシタピン(ゲムシタピン)	1000mg/m ²	day1, 8																																																																									
シスプラチン(シスプラチン)	75mg/m ²	day1																																																																									
デキササート(デキサメタゾン)	39.6mg/body	day1-4																																																																									
投与スケジュール <table border="1"> <thead> <tr> <th>GDP療法</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>...</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ゲムシタピン</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>シスプラチン</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デキサート</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1サイクル21日</p>	GDP療法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21	ゲムシタピン	●							●										シスプラチン	●																	デキサート	●	●	●	●														総投与時間 day1 5時間25分 day2-4 15分 day8 55分	血管外漏出リスク ゲムシタピン 炎症性抗がん剤 シスプラチン 炎症性抗がん剤	day8 ① 生理食塩液 100ml ルート確保・フラッシュ用 ↓ ② 生理食塩液 100ml デキサート 6.6mg 点滴 15分 ↓ ③ 生理食塩液 100ml ゲムシタピン m g 点滴 30分 総量100mLにする
GDP療法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	21																																																										
ゲムシタピン	●							●																																																																			
シスプラチン	●																																																																										
デキサート	●	●	●	●																																																																							
	その他必要な薬剤 アブレピタント125mg 1カプセル 点滴開始時(day1) アブレピタント80mg 1カプセル(day2-3) 分1 朝食後(day2-3)	投与時の	day2-3 アブレピタント80mg 1カプセル 内服 分1 朝食後																																																																								
	備考欄																																																																										