

レジメン名	FP+ベムプロリズマブ療法
診療科・対象疾患	外)進行再発食道癌
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	6サイクルまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
キイトルーダ	ベムプロリズマブ	200mg/body	Day1
シスプラチン	シスプラチン	80mg/m ²	Day1
フルオロウラシル	フルオロウラシル	800mg/m ² /日	Day1-5

		順下滴	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール										
								day1	day2	day3	day4	day5	day6	...	day21			
治療内容	注射	Rp1		生理食塩液	100ml	任意	ルート確保・フラッシュ用	●										
		Rp2	癌	キイトルーダ 生理食塩液	200mg 100ml	30分	点滴静注メイン	●										
					9:15~													
		Rp3		生理食塩液	50ml	15分	点滴静注メイン-経過観察用	●										
					9:45~													
		Rp4	癌	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 500ml	12時間	点滴静注メイン	●										
					Rp.5と同時に開始 10:00~													
		Rp5		ソリタT3号輸液	500ml	90分	点滴静注側管	●										
					Rp.4と同時に開始 10:00~													
		Rp6		ソリタT3号輸液	500ml	90分	点滴静注側管	●										
					11:30~													
		Rp7		生理食塩液 ホスアプレヒタント	100ml 1V	30分	点滴静注側管	●										
					13:00~													
Rp8		ハロノセトロン デキササート(6.6mg) デキササート(1.65mg)	1袋 1A 2A	30分	点滴静注側管	●												
			13:30~															
Rp9	癌	生理食塩液 シスプラチン	500ml 80mg/m ²	180分	点滴静注側管	●												
			14:00~ 総量500mLにする															
Rp10		ソルアセトF	500ml	90分	点滴静注側管	●												
			17:00~															
Rp11		ソルアセトF	500ml	90分	点滴静注側管	●												
			18:30~															
Rp12		マンニトールS	300ml	120分	点滴静注側管	●												
			20:00~															
RP.13	癌	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 500ml	12時間	点滴静注メイン	●												
			22:00~															
		順下滴	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール										
		Rp.1	癌	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 500ml	12時間	点滴静注メイン	day1	day2	day3	day4	day5	day6	...	day21			
				Rp.2と同時に開始10:00~				●	●	●	●	●						
		Rp.2		生理食塩液 デキササート	100ml 6.6mg	30分	点滴静注側管		●	●	●	●						
				Rp.1と同時に開始10:00~														
		Rp.3		ソリタT3号輸液	500ml	120分	点滴静注側管		●	●	●	●						
				10:30~														
		Rp.4		ソリタT3号輸液	500ml	120分	点滴静注側管		●	●	●	●						
				12:30~														
		Rp.5	癌	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m ² 500ml	12時間	点滴静注メイン		●	●	●	●						
				22:00~														
		順下滴	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール										
		Rp1		生理食塩液	100ml	任意	メインルート投与終了後フラッシュ	day1	day2	day3	day4	day5	day6	...	day21			
												●						
その他 必要薬剤																		
総投与時間	day1 14時間45分、day2-5 24時間持続、day6 10時間																	
血管外漏出 リスク	キイトルーダ(ベムプロリズマブ):非壊死性抗がん薬 フルオロウラシル:炎症性抗がん薬 シスプラチン:炎症性抗がん薬																	
投与時の 注意事項	キイトルーダ(ベムプロリズマブ):フィルター付きルートが必要 Infusion reaction Grade2の場合:本剤の投与を直ちに中止する。1時間以内に回復する場合には、投与速度を50%減速して再開する。																	
備考欄	【Infusion reaction経験例の前処置処方例】 投与前1.5時間(±0.5時間)に以下薬剤で前処置を行う。 レスタミンコーワ10mg 5錠 アセトアミノフェン300mg 2錠																	