

レジメン名 DA-EPOCH-R療法 レベル2

対象疾患 非ホジキンリンパ腫

指示書2枚のうち No.1

ChemoNavi		治療内容																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>375mg/m²</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td>60mg/m²</td> <td>day2-5</td> </tr> <tr> <td>オンコピン(ビンクリスチン)</td> <td>0.4mg/m²</td> <td>day2-5</td> </tr> <tr> <td>ドキソルビシン</td> <td>12mg/m²</td> <td>day2-5</td> </tr> <tr> <td>エンドキサン(シクロホスファミド)</td> <td>900mg/m²</td> <td>day6</td> </tr> <tr> <td>プレドニン(プレドニゾロン)</td> <td>120mg/m²/日</td> <td>day2-6</td> </tr> </tbody> </table>		薬品名(成分名)	投与量	投与日	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	エトポシド	60mg/m ²	day2-5	オンコピン(ビンクリスチン)	0.4mg/m ²	day2-5	ドキソルビシン	12mg/m ²	day2-5	エンドキサン(シクロホスファミド)	900mg/m ²	day6	プレドニン(プレドニゾロン)	120mg/m ² /日	day2-6	<p>投与サイクル数</p> <p>レベル1-6累計 8サイクルまで</p>	<p>day1</p> <p>* 内服</p> <table border="1"> <tr> <td>①</td> <td>ロキソプロフェン</td> <td>1錠</td> </tr> <tr> <td></td> <td>レスタミンコーワ</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td colspan="3">内服</td> </tr> </table> <p>* 点滴</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">A設定</th> <th colspan="2">B設定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>②</td> <td>生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</td> <td>②</td> <td>生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</td> <td>③</td> <td>生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>生理食塩液 500 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定 A設定</td> <td>④</td> <td>生理食塩液 500 ml リツキシマブ 375 mg/m² 滴下速度の設定 B設定</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 50ml/h ↓ (30分) 250ml/h ↓ (30分) 100ml/h ↓ (30分) 300ml/h ↓ (30分) 150ml/h ↓ (30分) 350ml/h ↓ (30分) 200ml/h ↓ (30分) 400ml/h </td> <td colspan="2"> 100ml/h (30分) ↓ 200ml/h (30分) ↓ 300ml/h (30分) ↓ 400ml/h </td> </tr> </tbody> </table>	①	ロキソプロフェン	1錠		レスタミンコーワ	3錠	内服			A設定		B設定		②	生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用	②	生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用	③	生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分	③	生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分	④	生理食塩液 500 ml リツキシマブ 375 mg/m ² 滴下速度の設定 A設定	④	生理食塩液 500 ml リツキシマブ 375 mg/m ² 滴下速度の設定 B設定	50ml/h ↓ (30分) 250ml/h ↓ (30分) 100ml/h ↓ (30分) 300ml/h ↓ (30分) 150ml/h ↓ (30分) 350ml/h ↓ (30分) 200ml/h ↓ (30分) 400ml/h		100ml/h (30分) ↓ 200ml/h (30分) ↓ 300ml/h (30分) ↓ 400ml/h													
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																															
リツキシマブ	375mg/m ²	day1																																																															
エトポシド	60mg/m ²	day2-5																																																															
オンコピン(ビンクリスチン)	0.4mg/m ²	day2-5																																																															
ドキソルビシン	12mg/m ²	day2-5																																																															
エンドキサン(シクロホスファミド)	900mg/m ²	day6																																																															
プレドニン(プレドニゾロン)	120mg/m ² /日	day2-6																																																															
①	ロキソプロフェン	1錠																																																															
	レスタミンコーワ	3錠																																																															
内服																																																																	
A設定		B設定																																																															
②	生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用	②	生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用																																																														
③	生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分	③	生理食塩液 100 ml ソル・コーテフ 100 mg 点滴、30分																																																														
④	生理食塩液 500 ml リツキシマブ 375 mg/m ² 滴下速度の設定 A設定	④	生理食塩液 500 ml リツキシマブ 375 mg/m ² 滴下速度の設定 B設定																																																														
50ml/h ↓ (30分) 250ml/h ↓ (30分) 100ml/h ↓ (30分) 300ml/h ↓ (30分) 150ml/h ↓ (30分) 350ml/h ↓ (30分) 200ml/h ↓ (30分) 400ml/h		100ml/h (30分) ↓ 200ml/h (30分) ↓ 300ml/h (30分) ↓ 400ml/h																																																															
投与スケジュール		<p>総投与時間</p> <p>A設定:約4時間 B設定:約3時間</p>																																																															
		<p>血管外漏出リスク</p> <p>リツキシマブ:不明</p>																																																															
		<p>その他必要薬剤</p> <p>ロキソプロフェン60mg 1錠 レスタミンコーワ10mg 3錠</p>																																																															
<p>DA-EPOCH-R療法 レベル2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>……</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドキソルビシン</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オンコピン</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンドキサン</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレドニン</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		治療日	1	2	3	4	5	6	……	21	リツキシマブ	●								エトポシド									ドキソルビシン									オンコピン									エンドキサン						●			プレドニン		●	●	●	●	●			<p>投与時の注意事項</p> <p>・day1: リツキシマブによるインフュージョンリアクション予防のため、点滴開始時にロキソプロフェン60mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を内服</p>
治療日	1	2	3	4	5	6	……	21																																																									
リツキシマブ	●																																																																
エトポシド																																																																	
ドキソルビシン																																																																	
オンコピン																																																																	
エンドキサン						●																																																											
プレドニン		●	●	●	●	●																																																											
		備考欄																																																															

レジメン名 DA-EPOCH-R療法 レベル2

対象疾患 非ホジキンリンパ腫

指示書2枚のうち No.2

ChemoNavi		投与サイクル数	レベル1-6累計 8サイクルまで	day 2	day 3	day 4																																																															
<table border="1"> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>375mg/m²</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td>60mg/m²</td> <td>day2-5</td> </tr> <tr> <td>オンコピン(ビンクリスチン)</td> <td>0.4mg/m²</td> <td>day2-5</td> </tr> <tr> <td>ドキソルビシン</td> <td>12mg/m²</td> <td>day2-5</td> </tr> <tr> <td>エンドキサン(シクロホスファミド)</td> <td>900mg/m²</td> <td>day6</td> </tr> <tr> <td>プレドニン(プレドニゾロン)</td> <td>120mg/m²/日</td> <td>day2-6</td> </tr> </table>		薬品名(成分名)	投与量	投与日	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	エトポシド	60mg/m ²	day2-5	オンコピン(ビンクリスチン)	0.4mg/m ²	day2-5	ドキソルビシン	12mg/m ²	day2-5	エンドキサン(シクロホスファミド)	900mg/m ²	day6	プレドニン(プレドニゾロン)	120mg/m ² /日	day2-6	総投与時間	day2: 14時間 day3-5: 24時間 day6: 10時間半	<p>*内服 分2、朝・昼 プレドニン _____錠</p> <p>*点滴 生理食塩液100ml ルート確保用</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、10:00 - 22:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、10:00</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、22:00-翌10:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、22:00</p>	<p>*内服 分2、朝・昼 プレドニン _____錠</p> <p>*点滴 持続点滴</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、10:00 - 22:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、10:00</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、22:00-翌10:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、22:00</p>	<p>*内服 分2、朝・昼 プレドニン _____錠</p> <p>*点滴 持続点滴</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、10:00 - 22:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、10:00</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、22:00-翌10:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、22:00</p>																																										
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																			
リツキシマブ	375mg/m ²	day1																																																																			
エトポシド	60mg/m ²	day2-5																																																																			
オンコピン(ビンクリスチン)	0.4mg/m ²	day2-5																																																																			
ドキソルビシン	12mg/m ²	day2-5																																																																			
エンドキサン(シクロホスファミド)	900mg/m ²	day6																																																																			
プレドニン(プレドニゾロン)	120mg/m ² /日	day2-6																																																																			
投与スケジュール		血管外漏出リスク	エトポシド: 炎症性 オンコピン(ビンクリスチン): 起壊死性 ドキソルビシン: 起壊死性 エンドキサン(シクロホスファミド): 炎症性	day 5	day 6																																																																
<p>DA-EPOCH-R療法 レベル2</p> <table border="1"> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>……</th> <th>21</th> </tr> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドキソルビシン</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オンコピン</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンドキサン</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレドニン</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		治療日	1	2	3	4	5	6	……	21	リツキシマブ	●								エトポシド									ドキソルビシン									オンコピン									エンドキサン						●			プレドニン		●	●	●	●	●			その他 必要薬剤		<p>*内服 分2、朝・昼 プレドニン _____錠</p> <p>*点滴 持続点滴</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、10:00 - 22:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、10:00</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、22:00-翌10:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、22:00</p>	<p>*内服 分2、朝・昼 プレドニン _____錠</p> <p>*点滴 持続点滴</p> <p>↓</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、10:00</p> <p>↓</p> <p>エンドキサン _____mg 生理食塩液 100 ml 30分、10:00 - 10:30</p> <p>↓</p> <p>生理食塩液100ml フラッシュ用</p>	
治療日	1	2	3	4	5	6	……	21																																																													
リツキシマブ	●																																																																				
エトポシド																																																																					
ドキソルビシン																																																																					
オンコピン																																																																					
エンドキサン						●																																																															
プレドニン		●	●	●	●	●																																																															
		投与時の 注意事項																																																																			
		備考欄																																																																			

三

三

三

