

レジメン名 DA-EPOCH-R療法 レベル3

対象疾患 非ホジキンリンパ腫

指示書2枚のうち No.1

ChemoNavi		治療内容																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>375mg/m²</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td>72mg/m²</td> <td>day2-5</td> </tr> <tr> <td>オンコピン(ビンクリスチン)</td> <td>0.4mg/m²</td> <td>day2-5</td> </tr> <tr> <td>ドキシゾビシン</td> <td>14.4mg/m²</td> <td>day2-5</td> </tr> <tr> <td>エンドキササン(シクロホスファミド)</td> <td>1080mg/m²</td> <td>day6</td> </tr> <tr> <td>プレドニン(プレドニゾロン)</td> <td>120mg/m²</td> <td>day2-6</td> </tr> </tbody> </table>		薬品名(成分名)	投与量	投与日	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	エトポシド	72mg/m ²	day2-5	オンコピン(ビンクリスチン)	0.4mg/m ²	day2-5	ドキシゾビシン	14.4mg/m ²	day2-5	エンドキササン(シクロホスファミド)	1080mg/m ²	day6	プレドニン(プレドニゾロン)	120mg/m ²	day2-6	投与サイクル数 レベル1-6累計 8サイクルまで	day1 * 内服 ① ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーワ 3錠 内服 * 点滴 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">A設定</th> <th colspan="2">B設定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>② 生理食塩液 100 ml</td> <td>↓</td> <td>② 生理食塩液 100 ml</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 生理食塩液 100 ml</td> <td>↓</td> <td>③ 生理食塩液 100 ml</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>ソル・コーテフ 100 mg</td> <td>↓</td> <td>ソル・コーテフ 100 mg</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>点滴、30分</td> <td></td> <td>点滴、30分</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ 生理食塩液 500 ml</td> <td>↓</td> <td>④ 生理食塩液 500 ml</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>リツキシマブ 375 mg/m²</td> <td>↓</td> <td>リツキシマブ 375 mg/m²</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>滴下速度の設定</td> <td></td> <td>滴下速度の設定</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A設定</td> <td colspan="2">B設定</td> </tr> <tr> <td>50ml/h</td> <td>↓</td> <td>100ml/h</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>(30分)</td> <td>250ml/h</td> <td>(30分)</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>(30分)</td> <td>↓</td> <td>200ml/h</td> </tr> <tr> <td>100ml/h</td> <td>↓</td> <td>(30分)</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>(30分)</td> <td>300ml/h</td> <td>↓</td> <td>300ml/h</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>(30分)</td> <td>↓</td> <td>(30分)</td> </tr> <tr> <td>150ml/h</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>400ml/h</td> </tr> <tr> <td>(30分)</td> <td>350ml/h</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>(30分)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>200ml/h</td> <td>↓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30分)</td> <td>400ml/h</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	A設定		B設定		② 生理食塩液 100 ml	↓	② 生理食塩液 100 ml	↓	ルート確保・フラッシュ用		ルート確保・フラッシュ用		③ 生理食塩液 100 ml	↓	③ 生理食塩液 100 ml	↓	ソル・コーテフ 100 mg	↓	ソル・コーテフ 100 mg	↓	点滴、30分		点滴、30分		④ 生理食塩液 500 ml	↓	④ 生理食塩液 500 ml	↓	リツキシマブ 375 mg/m ²	↓	リツキシマブ 375 mg/m ²	↓	滴下速度の設定		滴下速度の設定		A設定		B設定		50ml/h	↓	100ml/h	↓	(30分)	250ml/h	(30分)	↓	↓	(30分)	↓	200ml/h	100ml/h	↓	(30分)	↓	(30分)	300ml/h	↓	300ml/h	↓	(30分)	↓	(30分)	150ml/h	↓	↓	400ml/h	(30分)	350ml/h			↓	(30分)			200ml/h	↓			(30分)	400ml/h		
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																																										
リツキシマブ	375mg/m ²	day1																																																																																																										
エトポシド	72mg/m ²	day2-5																																																																																																										
オンコピン(ビンクリスチン)	0.4mg/m ²	day2-5																																																																																																										
ドキシゾビシン	14.4mg/m ²	day2-5																																																																																																										
エンドキササン(シクロホスファミド)	1080mg/m ²	day6																																																																																																										
プレドニン(プレドニゾロン)	120mg/m ²	day2-6																																																																																																										
A設定		B設定																																																																																																										
② 生理食塩液 100 ml	↓	② 生理食塩液 100 ml	↓																																																																																																									
ルート確保・フラッシュ用		ルート確保・フラッシュ用																																																																																																										
③ 生理食塩液 100 ml	↓	③ 生理食塩液 100 ml	↓																																																																																																									
ソル・コーテフ 100 mg	↓	ソル・コーテフ 100 mg	↓																																																																																																									
点滴、30分		点滴、30分																																																																																																										
④ 生理食塩液 500 ml	↓	④ 生理食塩液 500 ml	↓																																																																																																									
リツキシマブ 375 mg/m ²	↓	リツキシマブ 375 mg/m ²	↓																																																																																																									
滴下速度の設定		滴下速度の設定																																																																																																										
A設定		B設定																																																																																																										
50ml/h	↓	100ml/h	↓																																																																																																									
(30分)	250ml/h	(30分)	↓																																																																																																									
↓	(30分)	↓	200ml/h																																																																																																									
100ml/h	↓	(30分)	↓																																																																																																									
(30分)	300ml/h	↓	300ml/h																																																																																																									
↓	(30分)	↓	(30分)																																																																																																									
150ml/h	↓	↓	400ml/h																																																																																																									
(30分)	350ml/h																																																																																																											
↓	(30分)																																																																																																											
200ml/h	↓																																																																																																											
(30分)	400ml/h																																																																																																											
投与スケジュール		総投与時間 A設定:約4時間 B設定:約3時間																																																																																																										
		血管外漏出リスク リツキシマブ:不明																																																																																																										
DA-EPOCH-R療法 レベル3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>.....</th> <th>21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドキシゾビシン</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オンコピン</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンドキササン</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレドニン</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		治療日	1	2	3	4	5	6	21	リツキシマブ	●								エトポシド									ドキシゾビシン									オンコピン									エンドキササン						●			プレドニン		●	●	●	●	●			その他必要薬剤 ロキソプロフェン60mg 1錠 レスタミンコーワ10mg 3錠																																											
治療日	1	2	3	4	5	6	21																																																																																																				
リツキシマブ	●																																																																																																											
エトポシド																																																																																																												
ドキシゾビシン																																																																																																												
オンコピン																																																																																																												
エンドキササン						●																																																																																																						
プレドニン		●	●	●	●	●																																																																																																						
投与時の注意事項 *day1: リツキシマブによるインフュージョンリアクション予防のため、点滴開始時にロキソプロフェン60mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を内服		備考欄																																																																																																										

レジメン名 DA-EPOCH-R療法 レベル3

対象疾患 非ホジキンリンパ腫

指示書2枚のうち No.2

ChemoNavi			投与 サイクル数	レベル1-6累計 8サイクルまで	day 2	day 3	day 4																																																															
<table border="1"> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>375mg/m²</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td>72mg/m²</td> <td>day2-5</td> </tr> <tr> <td>オンコピン(ビンクリスチン)</td> <td>0.4mg/m²</td> <td>day2-5</td> </tr> <tr> <td>ドキソルビシン</td> <td>14.4mg/m²</td> <td>day2-5</td> </tr> <tr> <td>エンドキサン(シクロホスファミド)</td> <td>1080mg/m²</td> <td>day6</td> </tr> <tr> <td>プレドニン(プレドニゾロン)</td> <td>120mg/m²</td> <td>day2-6</td> </tr> </table>					薬品名(成分名)	投与量	投与日	リツキシマブ	375mg/m ²	day1	エトポシド	72mg/m ²	day2-5	オンコピン(ビンクリスチン)	0.4mg/m ²	day2-5	ドキソルビシン	14.4mg/m ²	day2-5	エンドキサン(シクロホスファミド)	1080mg/m ²	day6	プレドニン(プレドニゾロン)	120mg/m ²	day2-6	総投与時間 day2: 14時間 day3-5: 24時間 day6: 10時間30分	<p>*内服 分2、朝・昼 プレドニン _____錠</p> <p>*点滴 生理食塩液100ml ルート確保用</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、10:00 - 22:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、10:00</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、22:00-翌10:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、22:00</p>	<p>*内服 分2、朝・昼 プレドニン _____錠</p> <p>*点滴 持続点滴</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、10:00 - 22:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、10:00</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、22:00-翌10:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、22:00</p>	<p>*内服 分2、朝・昼 プレドニン _____錠</p> <p>*点滴 持続点滴</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、10:00 - 22:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、10:00</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、22:00-翌10:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、22:00</p>																																									
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																				
リツキシマブ	375mg/m ²	day1																																																																				
エトポシド	72mg/m ²	day2-5																																																																				
オンコピン(ビンクリスチン)	0.4mg/m ²	day2-5																																																																				
ドキソルビシン	14.4mg/m ²	day2-5																																																																				
エンドキサン(シクロホスファミド)	1080mg/m ²	day6																																																																				
プレドニン(プレドニゾロン)	120mg/m ²	day2-6																																																																				
投与スケジュール			血管外漏出リスク エトポシド: 炎症性 オンコピン(ビンクリスチン): 起壊死性 ドキソルビシン: 起壊死性 エンドキサン(シクロホスファミド): 炎症性	その他 必要薬剤	day 5	day 6																																																																
<p>DA-EPOCH-R療法 レベル3</p> <table border="1"> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>.....</th> <th>21</th> </tr> <tr> <td>リツキシマブ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドキソルビシン</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オンコピン</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンドキサン</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレドニン</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			治療日	1	2	3	4	5	6	21	リツキシマブ	●								エトポシド									ドキソルビシン									オンコピン									エンドキサン						●			プレドニン		●	●	●	●	●			投与時の 注意事項	備考欄	<p>*内服 分2、朝・昼 プレドニン _____錠</p> <p>*点滴 持続点滴</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、10:00 - 22:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、10:00</p> <p>↓</p> <p>エトポシド _____mg ドキソルビシン _____mg オンコピン _____mg 生理食塩液 500 ml 12時間、22:00-翌10:00</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、22:00</p>	<p>*内服 分2、朝・昼 プレドニン _____錠</p> <p>*点滴 持続点滴</p> <p>← グラニセトロン注 1袋 側管、全開、10:00</p> <p>↓</p> <p>エンドキサン _____mg 生理食塩液 100 ml 30分、10:00 - 10:30</p> <p>↓</p> <p>生理食塩液100ml フラッシュ用</p>	
治療日	1	2	3	4	5	6	21																																																														
リツキシマブ	●																																																																					
エトポシド																																																																						
ドキソルビシン																																																																						
オンコピン																																																																						
エンドキサン						●																																																																
プレドニン		●	●	●	●	●																																																																



