

レジメン名 EPd療法<50kg(1-2サイクル目)

対象疾患

多発性骨髄腫

ChemoNavi		治療内容 Day1, 8, 15, 22																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エムプリシティ(エロツムマブ)</td> <td>10mg/kg</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> <tr> <td>ボマリスト(ボマリドミド)</td> <td>4mg/body</td> <td>day1-21</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)*</td> <td>28mg/body</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> <tr> <td>デキサート(デキサメタゾン)</td> <td>6.6mg/body</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> </tbody> </table> <p>*レナデックスは 75歳以上の場合は8mg/bodyに減量考慮</p>	薬品名(成分名)	投与量	投与日	エムプリシティ(エロツムマブ)	10mg/kg	day1, 8, 15, 22	ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1-21	レナデックス(デキサメタゾン)*	28mg/body	day1, 8, 15, 22	デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg/body	day1, 8, 15, 22	<p>投与サイクル数</p> <p>2サイクル</p>	<table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>200mg 1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>300mg 1錠</td> </tr> <tr> <td>レスタミンコーワ</td> <td>10mg 3錠</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td>点滴開始時</td> </tr> </table>		レナデックス	mg	内服		アセトアミノフェン	200mg 1錠	アセトアミノフェン	300mg 1錠	レスタミンコーワ	10mg 3錠	内服	点滴開始時																																																			
	薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																														
エムプリシティ(エロツムマブ)	10mg/kg	day1, 8, 15, 22																																																																															
ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1-21																																																																															
レナデックス(デキサメタゾン)*	28mg/body	day1, 8, 15, 22																																																																															
デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg/body	day1, 8, 15, 22																																																																															
レナデックス	mg																																																																																
内服																																																																																	
アセトアミノフェン	200mg 1錠																																																																																
アセトアミノフェン	300mg 1錠																																																																																
レスタミンコーワ	10mg 3錠																																																																																
内服	点滴開始時																																																																																
	<p>総投与時間</p> <p>50kgの場合 A設定:約3時間 B設定:約2時間 C設定:約1時間30分</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A設定</th> <th>B設定</th> <th>C設定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用</td> <td>① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用</td> <td>① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 ml 点滴、15分</td> <td>② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分</td> <td>② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分</td> <td>③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分</td> <td>③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td>④ エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 150 mL</td> <td>④ エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 150 mL</td> <td>④ エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 150 mL</td> </tr> <tr> <td>滴下速度の設定 A設定 30mL/h (30分) ↓ 60mL/h (30分) ↓ 120mL/h</td> <td>滴下速度の設定 B設定 180mL/h (30分) ↓ 240mL/h</td> <td>滴下速度の設定 C設定 300mL/h</td> </tr> </tbody> </table>		A設定	B設定	C設定	① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用	① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用	① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用	↓	↓	↓	② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 ml 点滴、15分	② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分	② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分	↓	↓	↓	③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分	③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分	③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分	↓	↓	↓	④ エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 150 mL	④ エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 150 mL	④ エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 150 mL	滴下速度の設定 A設定 30mL/h (30分) ↓ 60mL/h (30分) ↓ 120mL/h	滴下速度の設定 B設定 180mL/h (30分) ↓ 240mL/h	滴下速度の設定 C設定 300mL/h																																																			
A設定	B設定	C設定																																																																															
① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用	① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用	① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用																																																																															
↓	↓	↓																																																																															
② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 ml 点滴、15分	② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分	② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分																																																																															
↓	↓	↓																																																																															
③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分	③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分	③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分																																																																															
↓	↓	↓																																																																															
④ エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 150 mL	④ エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 150 mL	④ エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 150 mL																																																																															
滴下速度の設定 A設定 30mL/h (30分) ↓ 60mL/h (30分) ↓ 120mL/h	滴下速度の設定 B設定 180mL/h (30分) ↓ 240mL/h	滴下速度の設定 C設定 300mL/h																																																																															
<p>血管外漏出リスク</p> <p>エムプリシティ(エロツムマブ): 不明</p>																																																																																	
<p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">EPd療法<50kg(1-2サイクル目)</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>28</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エムプリシティ</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボマリスト</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス*</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>デキサート</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1サイクル28日</p>	EPd療法<50kg(1-2サイクル目)													治療日	1	2	8	9	15	16	21	22	28				エムプリシティ	●		●		●			●					ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●					レナデックス*	●		●		●			●					デキサート	●		●		●			●					<p>投与時の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インフュージョンリアクション予防のためアセトアミノフェン200mg1錠、アセトアミノフェン300mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を点滴開始時に内服 ・フィルター付きルートで投与を行うこと。 ・エムプリシティの投与速度は300mL/hを超えないこと。 ・50kg以下の場合、エムプリシティ希釈液量は150mLとする。 		
EPd療法<50kg(1-2サイクル目)																																																																																	
治療日	1	2	8	9	15	16	21	22	28																																																																								
エムプリシティ	●		●		●			●																																																																									
ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																									
レナデックス*	●		●		●			●																																																																									
デキサート	●		●		●			●																																																																									
	備考欄																																																																																
		<p>day1-21</p> <table border="1"> <tr> <td>ボマリスト</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td>分1 朝食後</td> </tr> </table>		ボマリスト	mg	内服	分1 朝食後																																																																										
ボマリスト	mg																																																																																
内服	分1 朝食後																																																																																

レジメン名 EPd療法50-90kg(1-2サイクル目)

対象疾患 多発性骨髄腫

ChemoNavi			投与サイクル数		治療内容 Day1, 8, 15, 22																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エムプリシティ(エロツムマブ)</td> <td>10mg/kg</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> <tr> <td>ボマリスト(ボマリドミド)</td> <td>4mg/body</td> <td>day1-21</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)*</td> <td>28mg/body</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> <tr> <td>デキサート(デキサメタゾン)</td> <td>6.6mg/body</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> </tbody> </table> <p>*レナデックスは 75歳以上は8mg/bodyに減量考慮</p>			薬品名(成分名)	投与量	投与日	エムプリシティ(エロツムマブ)	10mg/kg	day1, 8, 15, 22	ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1-21	レナデックス(デキサメタゾン)*	28mg/body	day1, 8, 15, 22	デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg/body	day1, 8, 15, 22	2サイクル		<table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>200mg 1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>300mg 1錠</td> </tr> <tr> <td>レスタミンコーワ</td> <td>10mg 3錠</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td>点滴開始時</td> </tr> </table>			レナデックス	mg	内服		アセトアミノフェン	200mg 1錠	アセトアミノフェン	300mg 1錠	レスタミンコーワ	10mg 3錠	内服	点滴開始時																																																																																							
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																																																							
エムプリシティ(エロツムマブ)	10mg/kg	day1, 8, 15, 22																																																																																																																							
ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1-21																																																																																																																							
レナデックス(デキサメタゾン)*	28mg/body	day1, 8, 15, 22																																																																																																																							
デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg/body	day1, 8, 15, 22																																																																																																																							
レナデックス	mg																																																																																																																								
内服																																																																																																																									
アセトアミノフェン	200mg 1錠																																																																																																																								
アセトアミノフェン	300mg 1錠																																																																																																																								
レスタミンコーワ	10mg 3錠																																																																																																																								
内服	点滴開始時																																																																																																																								
<p>総投与時間</p> <p>60kgの場合 A設定:約4時間 B設定:約3時間 C設定:約2時間</p>			血管外漏出リスク		<p>エムプリシティ(エロツムマブ): 不明</p>																																																																																																																				
<p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">EPd療法50-90kg(1-2サイクル目)</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>28</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エムプリシティ</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボマリスト</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス*</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>デキサート</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1サイクル28日</p>			EPd療法50-90kg(1-2サイクル目)													治療日	1	2	8	9	15	16	21	22	28				エムプリシティ	●	●	●	●	●			●					ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●					レナデックス*	●		●		●			●					デキサート	●		●		●			●					<p>投与時の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> -インフュージョンリアクション予防のためアセトアミノフェン200mg1錠、アセトアミノフェン300mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を点滴開始時に内服 -フィルター付きルートで投与を行うこと。 -エムプリシティの投与速度は300mL/hを超えないこと。 -50kg-90kgの場合、エムプリシティ希釈液量は250mLとする。 		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">A設定</th> <th colspan="2">B設定</th> <th colspan="2">C設定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用</td> <td>①</td> <td>生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用</td> <td>①</td> <td>生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分</td> <td>②</td> <td>デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分</td> <td>②</td> <td>デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>生理食塩液 100 mL 点滴、45分</td> <td>③</td> <td>生理食塩液 100 mL 点滴、45分</td> <td>③</td> <td>生理食塩液 100 mL 点滴、45分</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 250 mL</td> <td>④</td> <td>エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 250 mL</td> <td>④</td> <td>エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 250 mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>滴下速度の設定</p> <p>A設定</p> <p>30mL/h (30分)</p> <p>↓</p> <p>60mL/h (30分)</p> <p>↓</p> <p>120mL/h</p> </td> <td colspan="2"> <p>滴下速度の設定</p> <p>B設定</p> <p>180mL/h (30分)</p> <p>↓</p> <p>240mL/h</p> </td> <td colspan="2"> <p>滴下速度の設定</p> <p>C設定</p> <p>300mL/h</p> </td> </tr> </tbody> </table>			A設定		B設定		C設定		①	生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用	①	生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用	①	生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用	②	デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分	②	デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分	②	デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分	③	生理食塩液 100 mL 点滴、45分	③	生理食塩液 100 mL 点滴、45分	③	生理食塩液 100 mL 点滴、45分	④	エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 250 mL	④	エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 250 mL	④	エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 250 mL	<p>滴下速度の設定</p> <p>A設定</p> <p>30mL/h (30分)</p> <p>↓</p> <p>60mL/h (30分)</p> <p>↓</p> <p>120mL/h</p>		<p>滴下速度の設定</p> <p>B設定</p> <p>180mL/h (30分)</p> <p>↓</p> <p>240mL/h</p>		<p>滴下速度の設定</p> <p>C設定</p> <p>300mL/h</p>	
EPd療法50-90kg(1-2サイクル目)																																																																																																																									
治療日	1	2	8	9	15	16	21	22	28																																																																																																																
エムプリシティ	●	●	●	●	●			●																																																																																																																	
ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																	
レナデックス*	●		●		●			●																																																																																																																	
デキサート	●		●		●			●																																																																																																																	
A設定		B設定		C設定																																																																																																																					
①	生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用	①	生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用	①	生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用																																																																																																																				
②	デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分	②	デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分	②	デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分																																																																																																																				
③	生理食塩液 100 mL 点滴、45分	③	生理食塩液 100 mL 点滴、45分	③	生理食塩液 100 mL 点滴、45分																																																																																																																				
④	エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 250 mL	④	エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 250 mL	④	エムプリシティ 10 mg/kg 生理食塩液 250 mL																																																																																																																				
<p>滴下速度の設定</p> <p>A設定</p> <p>30mL/h (30分)</p> <p>↓</p> <p>60mL/h (30分)</p> <p>↓</p> <p>120mL/h</p>		<p>滴下速度の設定</p> <p>B設定</p> <p>180mL/h (30分)</p> <p>↓</p> <p>240mL/h</p>		<p>滴下速度の設定</p> <p>C設定</p> <p>300mL/h</p>																																																																																																																					
<p>備考欄</p>					<p>day1-21</p> <table border="1"> <tr> <td>ボマリスト</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td>分1 朝食後</td> </tr> </table>			ボマリスト	mg	内服	分1 朝食後																																																																																																														
ボマリスト	mg																																																																																																																								
内服	分1 朝食後																																																																																																																								

レジメン名 EPd療法>90kg(1-2サイクル目)

対象疾患

多発性骨髄腫

ChemoNavi		治療内容 Day1, 8, 15, 22																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エムプリシティ(エロツムマブ)</td> <td>10mg/kg</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> <tr> <td>ボマリスト(ボマリドミド)</td> <td>4mg/body</td> <td>day1-21</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)*</td> <td>28mg/body</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> <tr> <td>デキサート(デキサメタゾン)</td> <td>6.6mg/body</td> <td>day1, 8, 15, 22</td> </tr> </tbody> </table> <p>*レナデックスは75歳以上の場合は8mg/bodyに減量考慮</p>		薬品名(成分名)	投与量	投与日	エムプリシティ(エロツムマブ)	10mg/kg	day1, 8, 15, 22	ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1-21	レナデックス(デキサメタゾン)*	28mg/body	day1, 8, 15, 22	デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg/body	day1, 8, 15, 22	<p>投与サイクル数: 2サイクル</p> <p>総投与時間: 90kgの場合 A設定: 約5時間 B設定: 約2時間45分 C設定: 約2時間20分</p> <p>血管外漏出リスク: エムプリシティ(エロツムマブ): 不明</p>	<p>レナデックス mg 内服</p> <p>アセトアミノフェン 200mg 1錠 アセトアミノフェン 300mg 1錠 レスタミンコーワ 10mg 3錠 内服 点滴開始時</p>																																																											
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																											
エムプリシティ(エロツムマブ)	10mg/kg	day1, 8, 15, 22																																																																											
ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1-21																																																																											
レナデックス(デキサメタゾン)*	28mg/body	day1, 8, 15, 22																																																																											
デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg/body	day1, 8, 15, 22																																																																											
<p>投与スケジュール</p> <p>EPd療法 1-2サイクル目</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>..</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>..</th> <th>#</th> <th>#</th> <th>..</th> <th>#</th> <th>..</th> <th>21</th> <th>..</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エムプリシティ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボマリスト</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>レナデックス*</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デキサート</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1サイクル28日</p> <p>・インフュージョンリアクション予防のためアセトアミノフェン200mg1錠、アセトアミノフェン300mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を点滴開始時に内服</p> <p>・フィルター付きルートで投与を行うこと。</p> <p>・エムプリシティの投与速度は300ml/hを超えないこと。</p> <p>・90kg以上の場合、エムプリシティ希釈液量は350mLとする。</p>		治療日	1	2	..	8	9	..	#	#	..	#	..	21	..	28	エムプリシティ	●			●			●			●			●		ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	レナデックス*	●			●			●			●			●		デキサート	●			●			●			●			●		<p>A設定</p> <p>① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分</p> <p>↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分</p> <p>↓</p> <p>④ エムプリシティー 10 mg/kg 生理食塩液 350 mL</p> <p>滴下速度の設定 A設定</p> <p>30mL/h (30分) ↓ 60mL/h (30分) ↓ 120mL/h</p> <p>B設定</p> <p>① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分</p> <p>↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分</p> <p>↓</p> <p>④ エムプリシティー 10 mg/kg 生理食塩液 350 mL</p> <p>滴下速度の設定 B設定</p> <p>180mL/h (30分) ↓ 240mL/h</p> <p>C設定</p> <p>① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生食 50 mL 点滴、15分</p> <p>↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分</p> <p>↓</p> <p>④ エムプリシティー 10 mg/kg 生理食塩液 350 mL</p> <p>滴下速度の設定 C設定</p> <p>300mL/h</p>
治療日	1	2	..	8	9	..	#	#	..	#	..	21	..	28																																																															
エムプリシティ	●			●			●			●			●																																																																
ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																															
レナデックス*	●			●			●			●			●																																																																
デキサート	●			●			●			●			●																																																																
備考欄		<p>day1-21</p> <p>ボマリスト mg 内服 分1 朝食後</p>																																																																											