

レジメン名 EPd療法<50kg(3サイクル目以降)

対象疾患 多発性骨髄腫

ChemoNavi		治療内容																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エムプリシティ(エロツムマブ)</td> <td>20mg/kg</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>ボマリスト(ボマリドミド)</td> <td>4mg/body</td> <td>day1-21</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)*</td> <td>28mg/body</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>デキサート(デキサメタゾン)</td> <td>6.6mg/body</td> <td>day 1</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)**</td> <td>40mg/body</td> <td>day 8, 15, 22</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Day1のレナデックスは、75歳以上は8mg/bodyに減量を考慮 ** Day8,15,22のレナデックスは、75歳以上は20mg/bodyに減量を考慮</p>	薬品名(成分名)	投与量	投与日	エムプリシティ(エロツムマブ)	20mg/kg	day1	ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1-21	レナデックス(デキサメタゾン)*	28mg/body	day1	デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg/body	day 1	レナデックス(デキサメタゾン)**	40mg/body	day 8, 15, 22	<p>投与サイクル数 PDまで</p> <p>総投与時間 50kgの場合 A設定:約2時間10分 B設定:約1時間40分</p> <p>血管外漏出リスク エムプリシティ(エロツムマブ): 不明</p>	<p>Day1</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>200mg 1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>300mg 1錠</td> </tr> <tr> <td>レスタミンコーワ</td> <td>10mg 3錠</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td>点滴開始時</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; background-color: yellow;">A設定</p> <p>① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生理食塩液 50 mL 点滴、15分</p> <p>↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分</p> <p>↓</p> <p>④ エムプリシティ 20 mg/kg 生理食塩液 150 mL</p> <p>滴下速度の設定 A設定 180mL/h (30分) ↓ 240mL/h</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; background-color: yellow;">B設定</p> <p>① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② デキサート 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生理食塩液 50 mL 点滴、15分</p> <p>↓</p> <p>③ 生理食塩液 100 mL 点滴、45分</p> <p>↓</p> <p>④ エムプリシティ 20 mg/kg 生理食塩液 150 mL</p> <p>滴下速度の設定 B設定 300mL/h</p> </div> </div>		レナデックス	mg	内服		アセトアミノフェン	200mg 1錠	アセトアミノフェン	300mg 1錠	レスタミンコーワ	10mg 3錠	内服	点滴開始時																																																																									
	薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																																							
エムプリシティ(エロツムマブ)	20mg/kg	day1																																																																																																								
ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1-21																																																																																																								
レナデックス(デキサメタゾン)*	28mg/body	day1																																																																																																								
デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg/body	day 1																																																																																																								
レナデックス(デキサメタゾン)**	40mg/body	day 8, 15, 22																																																																																																								
レナデックス	mg																																																																																																									
内服																																																																																																										
アセトアミノフェン	200mg 1錠																																																																																																									
アセトアミノフェン	300mg 1錠																																																																																																									
レスタミンコーワ	10mg 3錠																																																																																																									
内服	点滴開始時																																																																																																									
<p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13" style="background-color: yellow;">EPd療法<50kg(3サイクル目以降)</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>..</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>..</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>..</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>..</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エムプリシティ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボマリスト</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス 28mg/body*</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>デキサート 6.6mg/body</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス 40mg/body**</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1サイクル28日</p> <p>投与時の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インフュージョンリアクション予防のためアセトアミノフェン200mg1錠、アセトアミノフェン300mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を点滴開始時に内服 ・フィルター付きルートで投与を行うこと。 ・エムプリシティの投与速度は300mL/hを超えないこと。 ・50kg以下の場合、エムプリシティ希釈液量は150mLとする。 <p>備考欄</p>	EPd療法<50kg(3サイクル目以降)													治療日	1	2	..	8	9	..	15	16	..	21	22	..	28	エムプリシティ	●													ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				レナデックス 28mg/body*	●													デキサート 6.6mg/body	●													レナデックス 40mg/body**				●			●				●			<p>Day8, 15, 22</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td></td> </tr> </table> <p>Day 1-21</p> <table border="1"> <tr> <td>ボマリスト</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td></td> </tr> </table>	レナデックス	mg	内服		ボマリスト	mg	内服	
EPd療法<50kg(3サイクル目以降)																																																																																																										
治療日	1	2	..	8	9	..	15	16	..	21	22	..	28																																																																																													
エムプリシティ	●																																																																																																									
ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																
レナデックス 28mg/body*	●																																																																																																									
デキサート 6.6mg/body	●																																																																																																									
レナデックス 40mg/body**				●			●				●																																																																																															
レナデックス	mg																																																																																																									
内服																																																																																																										
ボマリスト	mg																																																																																																									
内服																																																																																																										

レジメン名

EPd療法50-90kg(3サイクル目以降)

対象疾患

多発性骨髄腫

ChemoNavi		治療内容																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エムプリシティ(エロツムマブ)</td> <td>20mg/kg</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>ボマリスト(ボマリドミド)</td> <td>4mg/body</td> <td>day1-21</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)*</td> <td>28mg/body</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>デキサート(デキサメタゾン)</td> <td>6.6mg/body</td> <td>day 1</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)**</td> <td>40mg/body</td> <td>day 8, 15, 22</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Day1のレナデックスは、75歳以上は8mg/bodyに減量を考慮 ** Day8,15,22のレナデックスは、75歳以上は20mg/bodyに減量を考慮</p>	薬品名(成分名)	投与量	投与日	エムプリシティ(エロツムマブ)	20mg/kg	day1	ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1-21	レナデックス(デキサメタゾン)*	28mg/body	day1	デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg/body	day 1	レナデックス(デキサメタゾン)**	40mg/body	day 8, 15, 22	<p>投与サイクル数</p> <p>PDまで</p>	<p>Day1</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>mg</td> <td>内服</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>200mg 1錠</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>300mg 1錠</td> <td></td> </tr> <tr> <td>レスタミンコーワ</td> <td>10mg 3錠</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">内服 点滴開始時</td> </tr> </table>		レナデックス	mg	内服	アセトアミノフェン	200mg 1錠		アセトアミノフェン	300mg 1錠		レスタミンコーワ	10mg 3錠		内服 点滴開始時																																																																								
	薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																																							
エムプリシティ(エロツムマブ)	20mg/kg	day1																																																																																																								
ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1-21																																																																																																								
レナデックス(デキサメタゾン)*	28mg/body	day1																																																																																																								
デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg/body	day 1																																																																																																								
レナデックス(デキサメタゾン)**	40mg/body	day 8, 15, 22																																																																																																								
レナデックス	mg	内服																																																																																																								
アセトアミノフェン	200mg 1錠																																																																																																									
アセトアミノフェン	300mg 1錠																																																																																																									
レスタミンコーワ	10mg 3錠																																																																																																									
内服 点滴開始時																																																																																																										
<p>総投与時間</p> <p>60kgの場合 A設定:約2時間20分 B設定:約2時間</p>	<p>血管外漏出リスク</p> <p>エムプリシティ(エロツムマブ): 不明</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">A設定</th> <th colspan="2">B設定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 生理食塩液</td> <td>100 mL</td> <td>① 生理食塩液</td> <td>100 mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ルートを確保・フラッシュ用</td> <td colspan="2">ルートを確保・フラッシュ用</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② デキサート</td> <td>6.6 mg</td> <td>② デキサート</td> <td>6.6 mg</td> </tr> <tr> <td>ファモチジン</td> <td>20 mg</td> <td>ファモチジン</td> <td>20 mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>50 mL</td> <td>生理食塩液</td> <td>50 mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">点滴、15分</td> <td colspan="2">点滴、15分</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 生理食塩液</td> <td>100 mL</td> <td>③ 生理食塩液</td> <td>100 mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">点滴、45分</td> <td colspan="2">点滴、45分</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ エムプリシティ</td> <td>20 mg/kg</td> <td>④ エムプリシティ</td> <td>20 mg/kg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>250 mL</td> <td>生理食塩液</td> <td>250 mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">点滴速度の設定</td> <td colspan="2">点滴速度の設定</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A設定</td> <td colspan="2">B設定</td> </tr> <tr> <td colspan="2">180m L/h (30分)</td> <td colspan="2">300m L/h</td> </tr> <tr> <td colspan="2">↓</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">240m L/h</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		A設定		B設定		① 生理食塩液	100 mL	① 生理食塩液	100 mL	ルートを確保・フラッシュ用		ルートを確保・フラッシュ用		↓		↓		② デキサート	6.6 mg	② デキサート	6.6 mg	ファモチジン	20 mg	ファモチジン	20 mg	生理食塩液	50 mL	生理食塩液	50 mL	点滴、15分		点滴、15分		↓		↓		③ 生理食塩液	100 mL	③ 生理食塩液	100 mL	点滴、45分		点滴、45分		↓		↓		④ エムプリシティ	20 mg/kg	④ エムプリシティ	20 mg/kg	生理食塩液	250 mL	生理食塩液	250 mL	点滴速度の設定		点滴速度の設定		A設定		B設定		180m L/h (30分)		300m L/h		↓				240m L/h																														
A設定		B設定																																																																																																								
① 生理食塩液	100 mL	① 生理食塩液	100 mL																																																																																																							
ルートを確保・フラッシュ用		ルートを確保・フラッシュ用																																																																																																								
↓		↓																																																																																																								
② デキサート	6.6 mg	② デキサート	6.6 mg																																																																																																							
ファモチジン	20 mg	ファモチジン	20 mg																																																																																																							
生理食塩液	50 mL	生理食塩液	50 mL																																																																																																							
点滴、15分		点滴、15分																																																																																																								
↓		↓																																																																																																								
③ 生理食塩液	100 mL	③ 生理食塩液	100 mL																																																																																																							
点滴、45分		点滴、45分																																																																																																								
↓		↓																																																																																																								
④ エムプリシティ	20 mg/kg	④ エムプリシティ	20 mg/kg																																																																																																							
生理食塩液	250 mL	生理食塩液	250 mL																																																																																																							
点滴速度の設定		点滴速度の設定																																																																																																								
A設定		B設定																																																																																																								
180m L/h (30分)		300m L/h																																																																																																								
↓																																																																																																										
240m L/h																																																																																																										
<p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="14">EPd療法50-90kg(3サイクル目以降)</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>..</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>..</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>..</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>..</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エムプリシティ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボマリスト</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス 28mg/body*</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>デキサート 6.6mg/body</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス 40mg/body**</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1サイクル28日</p>	EPd療法50-90kg(3サイクル目以降)														治療日	1	2	..	8	9	..	15	16	..	21	22	..	28	エムプリシティ	●													ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			レナデックス 28mg/body*	●													デキサート 6.6mg/body	●													レナデックス 40mg/body**				●			●				●			<p>投与時の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> -インフュージョンリアクション予防のためアセトアミノフェン200mg1錠、アセトアミノフェン300mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を点滴開始時に内服 -フィルター付きルートで投与を行うこと。 -エムプリシティの投与速度は300mL/hを超えないこと。 -50kg-90kgの場合、エムプリシティ希釈液量は250mLとする。 	<p>Day8, 15, 22</p> <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>mg</td> <td>内服</td> </tr> </table> <p>Day 1-21</p> <table border="1"> <tr> <td>ボマリスト</td> <td>mg</td> <td>内服</td> </tr> </table>	レナデックス	mg	内服	ボマリスト	mg	内服
EPd療法50-90kg(3サイクル目以降)																																																																																																										
治療日	1	2	..	8	9	..	15	16	..	21	22	..	28																																																																																													
エムプリシティ	●																																																																																																									
ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																															
レナデックス 28mg/body*	●																																																																																																									
デキサート 6.6mg/body	●																																																																																																									
レナデックス 40mg/body**				●			●				●																																																																																															
レナデックス	mg	内服																																																																																																								
ボマリスト	mg	内服																																																																																																								
備考欄																																																																																																										

レジメン名 EPd療法>90kg(3サイクル目以降)

対象疾患 多発性骨髄腫

ChemoNavi			投与 サイクル 数	PDまで	治療内容																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エムプリシティ(エロツムマブ)</td> <td>20mg/kg</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>ボマリスト(ボマリドミド)</td> <td>4mg/body</td> <td>day1-21</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)*</td> <td>28mg/body</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>デキサート(デキサメタゾン)</td> <td>6.6mg/body</td> <td>day 1</td> </tr> <tr> <td>レナデックス(デキサメタゾン)**</td> <td>40mg/body</td> <td>day 8, 15, 22</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Day1のレナデックスは、75歳以上は8mg/bodyに減量を考慮 ** Day8,15,22のレナデックスは、75歳以上は20mg/bodyに減量を考慮</p>					薬品名(成分名)	投与量	投与日	エムプリシティ(エロツムマブ)	20mg/kg	day1	ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1-21	レナデックス(デキサメタゾン)*	28mg/body	day1	デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg/body	day 1	レナデックス(デキサメタゾン)**	40mg/body	day 8, 15, 22	総投与時間	90kgの場合 A設定:約2時間35分 B設定:約2時間10分	Day1 <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>200mg 1錠</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>300mg 1錠</td> </tr> <tr> <td>レスタミンコーワ</td> <td>10mg 3錠</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td>点滴開始時</td> </tr> </table>		レナデックス	mg	内服		アセトアミノフェン	200mg 1錠	アセトアミノフェン	300mg 1錠	レスタミンコーワ	10mg 3錠	内服	点滴開始時																																																																								
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																																												
エムプリシティ(エロツムマブ)	20mg/kg	day1																																																																																																												
ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1-21																																																																																																												
レナデックス(デキサメタゾン)*	28mg/body	day1																																																																																																												
デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg/body	day 1																																																																																																												
レナデックス(デキサメタゾン)**	40mg/body	day 8, 15, 22																																																																																																												
レナデックス	mg																																																																																																													
内服																																																																																																														
アセトアミノフェン	200mg 1錠																																																																																																													
アセトアミノフェン	300mg 1錠																																																																																																													
レスタミンコーワ	10mg 3錠																																																																																																													
内服	点滴開始時																																																																																																													
血管外漏出リスク			エムプリシティ(エロツムマブ): 不明	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">A設定</th> <th colspan="2">B設定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 生理食塩液</td> <td>100 mL</td> <td>① 生理食塩液</td> <td>100 mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ルートを確保・フラッシュ用</td> <td colspan="2">ルートを確保・フラッシュ用</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② デキサート</td> <td>6.6 mg</td> <td>② デキサート</td> <td>6.6 mg</td> </tr> <tr> <td>ファモチジン</td> <td>20 mg</td> <td>ファモチジン</td> <td>20 mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>50 mL</td> <td>生理食塩液</td> <td>50 mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">点滴、15分</td> <td colspan="2">点滴、15分</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 生理食塩液</td> <td>100 mL</td> <td>③ 生理食塩液</td> <td>100 mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">点滴、45分</td> <td colspan="2">点滴、45分</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④ エムプリシティ</td> <td>20 mg/kg</td> <td>④ エムプリシティ</td> <td>20 mg/kg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>350 mL</td> <td>生理食塩液</td> <td>350 mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 滴下速度の設定 A設定 180mL/h (30分) ↓ 240mL/h </td> <td colspan="2"> 滴下速度の設定 B設定 300mL/h </td> </tr> </tbody> </table>		A設定		B設定		① 生理食塩液	100 mL	① 生理食塩液	100 mL	ルートを確保・フラッシュ用		ルートを確保・フラッシュ用		↓		↓		② デキサート	6.6 mg	② デキサート	6.6 mg	ファモチジン	20 mg	ファモチジン	20 mg	生理食塩液	50 mL	生理食塩液	50 mL	点滴、15分		点滴、15分		↓		↓		③ 生理食塩液	100 mL	③ 生理食塩液	100 mL	点滴、45分		点滴、45分		↓		↓		④ エムプリシティ	20 mg/kg	④ エムプリシティ	20 mg/kg	生理食塩液	350 mL	生理食塩液	350 mL	滴下速度の設定 A設定 180mL/h (30分) ↓ 240mL/h		滴下速度の設定 B設定 300mL/h																																														
A設定		B設定																																																																																																												
① 生理食塩液	100 mL	① 生理食塩液	100 mL																																																																																																											
ルートを確保・フラッシュ用		ルートを確保・フラッシュ用																																																																																																												
↓		↓																																																																																																												
② デキサート	6.6 mg	② デキサート	6.6 mg																																																																																																											
ファモチジン	20 mg	ファモチジン	20 mg																																																																																																											
生理食塩液	50 mL	生理食塩液	50 mL																																																																																																											
点滴、15分		点滴、15分																																																																																																												
↓		↓																																																																																																												
③ 生理食塩液	100 mL	③ 生理食塩液	100 mL																																																																																																											
点滴、45分		点滴、45分																																																																																																												
↓		↓																																																																																																												
④ エムプリシティ	20 mg/kg	④ エムプリシティ	20 mg/kg																																																																																																											
生理食塩液	350 mL	生理食塩液	350 mL																																																																																																											
滴下速度の設定 A設定 180mL/h (30分) ↓ 240mL/h		滴下速度の設定 B設定 300mL/h																																																																																																												
投与スケジュール			投与時の 注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・インフュージョンリアクション予防のためアセトアミノフェン200mg1錠、アセトアミノフェン300mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠を点滴開始時に内服 ・フィルター付きルートで投与を行うこと。 ・エムプリシティの投与速度は300mL/hを超えないこと。 ・90kg以上の場合、エムプリシティ希釈液量は350mLとする。 																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">EPd療法>90kg(3サイクル目以降)</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>..</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>..</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>..</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>..</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エムプリシティ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボマリスト</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス 28mg/body*</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>デキサート 6.6mg/body</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>レナデックス 40mg/body**</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1サイクル28日</p>				EPd療法>90kg(3サイクル目以降)													治療日	1	2	..	8	9	..	15	16	..	21	22	..	28	エムプリシティ	●													ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			レナデックス 28mg/body*	●													デキサート 6.6mg/body	●													レナデックス 40mg/body**				●			●				●			備考欄	Day8, 15, 22 <table border="1"> <tr> <td>レナデックス</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td></td> </tr> </table> Day 1-21 <table border="1"> <tr> <td>ボマリスト</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>内服</td> <td></td> </tr> </table>		レナデックス	mg	内服		ボマリスト	mg	内服
EPd療法>90kg(3サイクル目以降)																																																																																																														
治療日	1	2	..	8	9	..	15	16	..	21	22	..	28																																																																																																	
エムプリシティ	●																																																																																																													
ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																			
レナデックス 28mg/body*	●																																																																																																													
デキサート 6.6mg/body	●																																																																																																													
レナデックス 40mg/body**				●			●				●																																																																																																			
レナデックス	mg																																																																																																													
内服																																																																																																														
ボマリスト	mg																																																																																																													
内服																																																																																																														