

[illegible]

レジメン名DPd療法(sc, 3-6サイクル目)

対象疾患多発性骨髄腫

ChemoNavi

★DPd療法(sc, 3-6サイクル目)

薬品名(成分名)	投与量	投与日
ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg/body	day1, 15
ボマリドミド	4mg/body	day1~21
レナデックス(デキサメタゾン)*	20mg/body	day1,2,8,9, 15, 16, 22, 23

* 75歳超える又は過小体重(BMI 18.5kg/m2未満)の患者はレナデックスを週20mg(10mg/回)への減量可

・ダラキューロ配合皮下注1瓶15mL中にダラツムマブ1800mg含む

投与スケジュール

★DPd療法(sc, 3-6サイクル目)

	1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラキューロ	●						●										
ボマリドミド	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
レナデックス*	●	●		●	●		●	●			●	●					

投与
サイクル数

★最大4サイクル

総投与時間

皮下注射・内服

血管外漏出リスク

投与時の
注意事項

＊ ＊レナデックス、レスタミンコーワ、アセトアミノフェン、モンテルカストはダラキューロ投与1時間前に内服する。

・ダラキューロは使用する30分前に冷蔵庫から取り出し、15-30℃に戻した後に使用する。

・翼状針使用のため1瓶全量(約16mL)を抜き取る。

・ダラキューロは注射針の目詰まりを避けるため、使用直前に皮下注射をシリンジに取り付ける。

・ダラキューロは調製後、4時間以内に使用する。

・臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、約3-5分かけて投与する。

・同一部位への反復注射は行わないこと。

備考欄

ダラキューロ投与前に不規則抗体のスクリーニングを含めた一般的な輸血前検査を実施すること。

治療内容

day1,15

内服

レナデックス錠

分1朝**

レスタミンコーワ錠10mg

3錠

アセトアミノフェン錠200mg

1錠

アセトアミノフェン錠300mg

1錠

モンテルカスト 10mg

1錠

分1朝**

皮下注射

ダラキューロ

1800mg

腹部に皮下注

内服

ボマリドミド錠

分1朝

day3-7, 10-14, 17-21

内服

ボマリドミド錠

分1朝

day2, 8, 9, 16,

内服

レナデックス錠

分1朝

ボマリドミド錠

分1朝

day 22, 23

内服

レナデックス錠

分1朝

レジメン名

DPd療法(sc, 7サイクル目以降)

対象疾患

多発性骨髄腫

ChemoNavi				治療内容																																																																																							
★DPd療法(sc, 7サイクル目以降) <table><tr><th>薬品名(成分名)</th><th>投与量</th><th>投与日</th></tr><tr><td>ダラキューロ(ダラツムマブ)</td><td>1800mg/body</td><td>day1</td></tr><tr><td>ボマリスト(ボマリドミド)</td><td>4mg/body</td><td>day1～21</td></tr><tr><td>レナデックス(デキサメタゾン)*</td><td>20mg/body</td><td>day1,2,8,9, 15, 16, 22, 23</td></tr></table> * 75歳超える又は過小体重(BMI 18.5kg/m2未満)の患者はレナデックスを週20mg(10mg/回)への減量可 ・ダラキューロ配合皮下注1瓶15mL中にダラツムマブ1800mg含む 投与スケジュール ★DPd療法(sc, 7サイクル目以降) <table><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>...</th><th>8</th><th>9</th><th>...</th><th>15</th><th>16</th><th>...</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th></tr><tr><td>ダラキューロ</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ボマリスト</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>レナデックス*</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				薬品名(成分名)	投与量	投与日	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg/body	day1	ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1～21	レナデックス(デキサメタゾン)*	20mg/body	day1,2,8,9, 15, 16, 22, 23		1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	22	23	24	25	26	27	28	ダラキューロ	●																	ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								レナデックス*	●	●		●	●		●	●			●	●						day1		day2, 8, 9, 15, 16,	
				薬品名(成分名)	投与量	投与日																																																																																					
				ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800mg/body	day1																																																																																					
				ボマリスト(ボマリドミド)	4mg/body	day1～21																																																																																					
				レナデックス(デキサメタゾン)*	20mg/body	day1,2,8,9, 15, 16, 22, 23																																																																																					
	1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																										
ダラキューロ	●																																																																																										
ボマリスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																	
レナデックス*	●	●		●	●		●	●			●	●																																																																															
投与サイクル数		★PDまで		内服		内服																																																																																					
総投与時間		皮下注射・内服		レナデックス錠 分 1 朝 **		レナデックス錠 分 1 朝																																																																																					
血管外漏出リスク				レスタミンコーワ錠10mg 3錠 アセトアミノフェン錠200mg 1錠 アセトアミノフェン錠300mg 1錠 モンテルカスト 10mg 1錠 分 1 朝 **		ボマリスト錠 分 1 朝																																																																																					
投与時の注意事項				皮下注射		内服																																																																																					
				ダラキューロ 1800mg 腹部に皮下注		ボマリスト錠 分 1 朝																																																																																					
				day3-7, 10-14, 17-21		day 22, 23																																																																																					
備考欄		ダラキューロ投与前に不規則抗体のスクリーニングを含めた一般的な輸血前検査を実施すること。		内服		内服																																																																																					
				ボマリスト錠 分 1 朝		レナデックス錠 分 1 朝																																																																																					