

レジメン名 モガムリズマブ療法(1-5サイクル目)

対象疾患 再発または難治性のCCR陽性の皮膚T細胞リンパ腫

ChemoNavi					治療内容 Day1																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポテリジオ(モガムリズマブ)</td> <td>1mg/kg</td> <td>day1</td> </tr> </tbody> </table>			薬品名(成分名)	投与量	投与日	ポテリジオ(モガムリズマブ)	1mg/kg	day1	投与 サイクル数	5サイクルまで	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン錠</td> <td>200mg</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠</td> <td>300mg</td> </tr> <tr> <td>レスタミンコーワ錠10mg</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td colspan="2">内服、点滴開始時</td> </tr> </tbody> </table> <p>①</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>100ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ルート確保・フラッシュ用</td> </tr> </tbody> </table> <p>↓</p> <p>②</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ソル・コーテフ</td> <td>100mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>100ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">点滴、30分</td> </tr> </tbody> </table> <p>↓</p> <p>③</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ポテリジオ</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>250mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">点滴、2時間</td> </tr> </tbody> </table>	アセトアミノフェン錠	200mg	アセトアミノフェン錠	300mg	レスタミンコーワ錠10mg	3錠	内服、点滴開始時		生理食塩液	100ml	ルート確保・フラッシュ用		ソル・コーテフ	100mg	生理食塩液	100ml	点滴、30分		ポテリジオ	mg	生理食塩液	250mL	点滴、2時間	
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																	
ポテリジオ(モガムリズマブ)	1mg/kg	day1																																	
アセトアミノフェン錠	200mg																																		
アセトアミノフェン錠	300mg																																		
レスタミンコーワ錠10mg	3錠																																		
内服、点滴開始時																																			
生理食塩液	100ml																																		
ルート確保・フラッシュ用																																			
ソル・コーテフ	100mg																																		
生理食塩液	100ml																																		
点滴、30分																																			
ポテリジオ	mg																																		
生理食塩液	250mL																																		
点滴、2時間																																			
			総投与時間	2時間40分																															
			血管外漏 出リスク	ポテリジオ(モガムリズマブ):不明																															
			投与時の 注意事項	・infusion reactionを軽減させるため、ポテリジオ投与30分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、副腎皮質ホルモンの前投与を行う。																															
投与スケジュール																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">モガムリズマブ療法</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポテリジオ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1サイクル7日</p>			モガムリズマブ療法								治療日	1	2	3	4	5	6	7	ポテリジオ	●															
モガムリズマブ療法																																			
治療日	1	2	3	4	5	6	7																												
ポテリジオ	●																																		
			備考欄	6サイクル以降はポテリジオは2週間間隔で投与する。																															

レジメン名 モガムリズマブ療法(6サイクル目以降)

対象疾患 再発または難治性のCCR陽性の皮膚T細胞リンパ腫

ChemoNavi					治療内容 Day1																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポテリジオ(モガムリズマブ)</td> <td>1mg/kg</td> <td>day1</td> </tr> </tbody> </table>			薬品名(成分名)	投与量	投与日	ポテリジオ(モガムリズマブ)	1mg/kg	day1	投与 サイクル数	PDまで	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン錠</td> <td>200mg</td> </tr> <tr> <td>アセトアミノフェン錠</td> <td>300mg</td> </tr> <tr> <td>レスタミンコーワ錠10mg</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td colspan="2">内服、点滴開始時</td> </tr> </tbody> </table> <p>①</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>100ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ルート確保・フラッシュ用</td> </tr> </tbody> </table> <p>↓</p> <p>②</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ソル・コーテフ</td> <td>100mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>100ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">点滴、30分</td> </tr> </tbody> </table> <p>↓</p> <p>③</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ポテリジオ</td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>生理食塩液</td> <td>250mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">点滴、2時間</td> </tr> </tbody> </table>	アセトアミノフェン錠	200mg	アセトアミノフェン錠	300mg	レスタミンコーワ錠10mg	3錠	内服、点滴開始時		生理食塩液	100ml	ルート確保・フラッシュ用		ソル・コーテフ	100mg	生理食塩液	100ml	点滴、30分		ポテリジオ	mg	生理食塩液	250mL	点滴、2時間	
薬品名(成分名)	投与量	投与日																																	
ポテリジオ(モガムリズマブ)	1mg/kg	day1																																	
アセトアミノフェン錠	200mg																																		
アセトアミノフェン錠	300mg																																		
レスタミンコーワ錠10mg	3錠																																		
内服、点滴開始時																																			
生理食塩液	100ml																																		
ルート確保・フラッシュ用																																			
ソル・コーテフ	100mg																																		
生理食塩液	100ml																																		
点滴、30分																																			
ポテリジオ	mg																																		
生理食塩液	250mL																																		
点滴、2時間																																			
			総投与時間	2時間40分																															
			血管外漏 出リスク	ポテリジオ(モガムリズマブ):不明																															
			投与時の 注意事項	・infusion reactionを軽減させるため、ポテリジオ投与30分前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、副腎皮質ホルモンの前投与を行う。																															
投与スケジュール																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">モガムリズマブ療法</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポテリジオ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1サイクル14日</p>			モガムリズマブ療法								治療日	1	14	ポテリジオ	●															
モガムリズマブ療法																																			
治療日	1	14																												
ポテリジオ	●																																		
			備考欄	6サイクル以降はポテリジオは2週間間隔で投与する。																															